



اسم المقال: البرمجة الخطية المتعددة الدوال

اسم الكاتب: م.م. خالد عبدالله العلاف

رابط ثابت: <https://political-encyclopedia.org/library/3264>

تاريخ الاسترداد: 2026/06/05 06:10 +03

الموسوعة السياسية هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسية - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على [info@political-encyclopedia.org](mailto:info@political-encyclopedia.org)

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسية - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام المتاحة على الموقع <https://political-encyclopedia.org/terms-of-use>



## البرمجة الخطية المتعددة الدوال

خالد عبدالله العلاف

مدرس مساعد - قسم العلوم المالية والمصرفية  
كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الموصل

### المستخلص

تناول البحث التطورات الخاصة بالبرمجة الرياضية فيما يخص الانتقال من دالة هدف واحدة إلى تعددية دوال الهدف، والتي باتت تعرف بالبرمجة الرياضية المتعددة الدوال Multi-Objective Mathematical Programming (MOMP)، وسنتناول بالتحديد أنموذج البرمجة الخطية المتعددة الدوال Multi-Objective Linear Programming (MOLP) ذات أسبقيات معجمية من حيث الصياغة وبناء الأنموذج الرياضي وطرائق الحل الخاصة به، وتم استخدام طريقة السمبلكس المعدلة متعددة المعايير ذات الوجهين Two Phase R. M. S. M. للنماذج الخطية كبيرة الحجم ذات القيود المتنوعة حاسوبياً وطريقة السمبلكس متعددة المعايير M. S. M. لحل المشاكل صغيرة الحجم يدوياً لغرض الوصول إلى الحل النهائي. وبالتطبيق على حالة دراسية تخص مشكلة قرار بثلاث دوال وتمتلك أسبقيات معجمية، الأولى والثالثة منها في حالة تعظيم والثانية في حالة تصغير، وبعد صياغة الأنموذج وإيجاد الحل النهائي الأمثل حاسوبياً تم تحليل النتائج والحصول على حل أمثل يوصف بأنه حل غير سائد ذي قيم ربحية مختلفة للدوال قيد الأمثلية.

### Multiple Objective Linear Programming

Khalid A. Al-Alaaf

Assistant lecturer

Department of Financial and Banking Sciences

University of Mosul

### Abstract

This research tried to cover the development of tradition mathematical programming to mathematical programming with multiple objective models (MOMP). This done by transformation of linear programming to multiple objective linear programming (MOLP) with lexicographically priority and solve the decision problem by using two phase multi-

criteria. They are revised simplex method (Two Phase R. M. S. M.) in large and complex system. The multi-criteria simplex method (M. S. M.) was used in small problem to reach the optimal solution which known as non-dominated solution. The case study concerned with decision making problem. Three functions have been used as lexicographical priorities such the first and third functions in maximization case; the second was in the minimization case. The model building for the problem was made to find the final solution. It is found that the non – dominated case have different profits for the functions.

## المقدمة

تعدّ البرمجة الخطية المقدمة من قبل Dantzig عام 1947 من أهم وأبرز النماذج الرياضية لتمثيل المشاكل في مختلف القطاعات والمؤسسات سواء أكانت مالية أم إنتاجية، صحية، أم تعليمية، مدنية أم عسكرية. وطريقة السمبلكس المستخدمة في حل نماذجها مازالت أكثر الطرائق شيوعاً وقبولاً على الرغم من وجود طرائق أخرى إلا أنها لم تستطع مجاراة خوارزمية السمبلكس إلى يومنا هذا بالكثير من الخواص والمميزات. وفي عقد السبعينات والثمانينات جرت العديد من الإضافات والتوسعات والتطورات على نماذج البرمجة الخطية والرياضية عموماً لتجاوز العديد من محدوداتها والمعوقات التي واجهت هذا النوع من النماذج سواء عند الصياغة أو الحل. وقدمت العديد من النماذج كالبرمجة الهدفية (GP) Goal Programming والبرمجة الخطية المتعدد الدوال\* (MOLP) Multiple Objective Linear Programming

- \* ينوه الباحث بدءاً إلى إمكانية وجود عدة ترجمات لمصطلح Multiple Objective Linear Programming والمعروف باختصار (MOLP) وكالاتي:
- (البرمجة الخطية المتعددة الأغراض) والتي تستند إلى ترجمة Objective (بالغرض)، وهي الترجمة الأحدث والأكثر دقة لكنها مازالت نادرة الاستخدام.
  - (البرمجة الخطية المتعددة دوال الهدف) والتي تستند إلى ترجمة Objective (بالهدف)، وهي الترجمة الأقل دقة لكنها شائعة الاستخدام.
  - (البرمجة الخطية المتعددة الدوال)، وهي الترجمة التي أخذ بها الباحث لإظهار جوهر المصطلح العلمي والأنموذج قيد الدراسة، والذي يتميز بعدة دوال Mult-Function وليس دالة واحدة One-Function، ولكي لا يتعارض مع ترجمة أنموذج جديد للبرمجة الهدفية (GP) أطلق عليه Multi Goal Linear Programming والمعروف باختصار (MGLP) والذي ستكون ترجمته استناداً إلى ما سبق (بالبرمجة الخطية المتعددة الأهداف) بترجمة كلمة (Goal) بالهدف. وبهذا أصبح لدينا أنموذجان يختلفان من حيث الشكل والجوهر والحل المستخرج، وبهذا لا بد لهما من ترجمات مختلفة.
  - يمكن الرجوع إلى مصدر رقم (٤) في قائمة المصادر لدراسة الفروقات بين مصطلحي (Objective) و(Goal) واستخدامهما ومكوناتهما في نماذج البرمجة الرياضية الحديثة الذي يعرفهما كالاتي:
  - Objective (الغرض): مطلب غير محدد موصوف مباشرة (تعظيم أو تصغير) يجب الوصول فيه إلى أقصى حد ممكن.
  - Goal (الهدف): مطلب ثابت مؤقت يجب إنجاز قدر الإمكان في صياغة المشكلة المعطاة.

والبرمجة اللاخطية (NLP) Non-Linear Programming وأدخل متجه المخاطرة Risk Vector ونظرية الفوضى Fuzzy Theory والتصادية Stochastic على هذه النماذج لتدخل بذلك أماكن وتطبيقات كان من المستحيل دخولها بإمكانيات البرمجة الرياضية التقليدية.

وفي هذا البحث سيتم دراسة أحد هذه التطورات والتوسعات بتناول أنموذج MOLP تحديداً وطرائق السمبلكس المحدثه مثل M.S.M. لحل المشاكل الصغيرة الحجم و Two Phase R.M.S.M. لحل المشاكل الكبيرة الحجم والشاملة لمختلف أنواع القيود بالتطبيق العملي على إحدى الحالات الدراسية الخاصة بمستشفى تخصصي بالجراحة يرغب بتعظيم وتدنية ثلاثة دوال ذات أسبقيات معجمية وفي ظل مجموعة من القيود المهمة.

### مشكلة البحث (نظرياً)

في هذا البحث سنتناول مشكلة عامة لدى متخذ القرار تمتلك المواصفات الآتية:

١. وجود عدة دوال هدف لدى متخذ القرار.

٢. الدوال تمتلك أسبقيات معجمية.

٣. وجود مجموعة من القيود.

وبهذا سيكون لدينا مشكلة اتخاذ قرار متعددة الدوال Multiple Objective

Decision Making Problem المعروفة باختصار "MODM" والتي يمكن التعبير

عنها بالأنموذج الرياضي العام الآتي:

$$\max [f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)]$$

$$\text{s.t.} : g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

إلا أننا سنتناول حالة خاصة للأنموذج\* المذكور آنفاً، وهي أن تكون الدوال والقيود خطية وبهذا سيتم التعبير عن المشكلة لدى متخذ القرار بالأنموذج الخاص الآتي:

\* ينوه الباحث إلى ما يأتي:

- يمكن أن تكون جميع النماذج في البحث بشكل Max or Min أو معيار آخر مثل Minmax أو Maxmin حسب الأنموذج قيد الدراسة.
- وبالنسبة للقيود يمكن أن تكتب أيضاً بأشكال أخرى مثل التعبير عن الطرف الأيمن بثابت غير صفري مثل  $b$ .
- النماذج المذكورة آنفاً تحتوي على  $m$  قيد و  $k$  دالة.

$$\max[C_{-1}^T X, C_{-2}^T X, \dots, C_{-K}^T X]$$

$$s.t. \quad AX \leq b$$

$$X \geq 0$$

من هنا سيكون لدينا مشكلة برمجة خطية متعددة الدوال Multiple Objective Linear Programming problem ذات أسبقيات معجمية Lexicographically Priority قيد الدراسة والحل والتطبيق.

أما مشكلة البحث (عملياً) فتتمثل بوجود مستشفى أهلي تخصصي بالجراحة العامة يرغب متخذي القرار فيه بتعظيم أرباحهم من العمليات الكبرى كأسبقية أولى، ويرغبون بتدنيه مجموع العمليات الصغرى لديهم كأسبقية لاحقة، وكذلك لديهم الرغبة بتعظيم أرباحهم من العمليات الوسطى كأسبقية أخيرة، في ظل عدة قيود مفروضة عليهم، أهمها الكادر الطبي التخصصي وغرف العمليات وحجم الطلب.

#### هدف البحث

- إن هذا البحث يهتم بإنجاز مجموعة من الأهداف التي يمكن حصرها بما يأتي:
١. تقديم نموذج (MOLP) يمتلك كفاءة عالية في تمثيل مشكلة القرار Decision Problem الموصوفة نظرياً في مشكلة البحث.
  ٢. التعريف بمصطلح الأسبقيات المعجمية Lex. Priority المعتمد تحديداً في بعض نماذج البرمجة الرياضية المتعدد الدوال MOMP.
  ٣. تقديم أهم وأبرز طرائق حل أنموذج MOLP تحديداً بالشكل الآتي:
    - طريقة السمبلكس المتعددة المعايير Multicriterion Simplex Method والمختصرة (M.S.M.).
    - طريقة السمبلكس المتعددة المعايير المعدلة ذات الوجهين Two Phase Multicriterion Revised Simplex Method الجبرية والمختصرة (Two Phase R.M.S.M.).
  ٤. إيجاد الحل النهائي لاختيار المزيج الإنتاجي الأمثل من العمليات الجراحية الموصوفة بثلاث دوال هدفية معجمية.

#### أهمية البحث

تتأتى أهمية البحث من أهمية تطبيقات البرمجة الخطية، وكذلك من أهمية التطور الحاصل بها من حيث تعددية الدوال الممكن الأخذ بها، مما يتيح لهذا الأنموذج MOLP استخدامات وتطبيقات أوسع في شتى المجالات والقطاعات، من

هنا أصبح الأنموذج يمتلك واقعية أكبر في تمثيل المشاكل التي تبحث عن أمثلية متعددة المعايير\* .

### منهجية البحث

إن منهجية هذا البحث تعتمد الخطوات ذاتها المتبعة بمنهجية العمل بأساليب بحوث العمليات عامة (تحديد المشكلة، الصياغة، بناء الأنموذج، إيجاد الحل النهائي، التطبيق والمتابعة للأنموذج) مع التركيز على طرائق الحل المقترحة بحل الأنموذج الخاص قيد الدراسة والمتمثلة بطريقتي (M.S.M., Two phase R.M.S.M.).

### الجانب النظري: أنموذج البرمجة الخطية Linear Programming Model

#### ١. أهمية البرمجة الخطية

يعد أنموذج البرمجة الخطية (LP) Linear Programming Model أحد أهم وأبرز نماذج البرمجة الرياضية التقليدية Trad . Math. Prog. المعروفة باختصار (MP) والمقدم من قبل العالم Dantzig عام 1947، إذ تم في حينها اقتراح طريقة السمبلكس (S.M.) Simplex Method أسلوباً لإيجاد الحل الأمثل Optimal Sol. والتي جرى تطويرها عام 1954 باشتقاق طريقة السمبلكس المعدلة Revised Simplex Method (R.S.M.) التي تتميز بكفاءة كبيرة عند الأخذ بها حاسوبياً من خلال اختزالها لحجم البيانات الذي يخزن ويبدل عند كل تكرار Iteration باعتمادها التمثيل الجبري، لكن لا بد من التأكيد على أنه لا يوجد أي اختلاف آخر من حيث خوارزمية الحل المتبعة في كلا الطريقتين\*\* .

وجرت العادة على تمثيل أنموذج البرمجة الخطية (بالمصفوفات) بالشكل الآتي:

$$\begin{aligned} \max \quad & f = \underline{c}^T \underline{X} \\ \text{s.t.} \quad & A \underline{X} \leq \underline{b} \\ & \underline{X} \geq \underline{O} \end{aligned}$$

\* إن كلمات مثل معيار Criteria أو متجه Vector أو غرض Objective أو هدف Goal أو صفة Attribute جميعها تختلف إحداها عن الأخرى، لكنها تشترك عموماً عند تداولها بوجود تعددية Mult في أمر ما.

\*\* لمزيد من التفاصيل أنظر عربية عبد الرحمن داود "مقارنة نظرية وعملية بين طريقتي السمبلكس الاعتيادية والسمبلكس المعدلة مع تطبيق في مجال الصحة" جامعة الموصل 1988.

إن الأنموذج المذكور أنفاً يمتلك مجموعة من المواصفات، ويتطلب مجموعة من المستلزمات الواجب توفرها، ويعتمد على مجموعة من النظريات المتعلقة بإيجاد نقاط الحل الخاصة بمنطقة الحل الأمثل.

أما طرائق حل هذا الأنموذج فذكرنا أنفاً أهم وأبرز الطرائق R.S.M. و S.M. وفي ما يأتي تذكرة موجزة وبسيطة لخوارزمية الحل بطريقة السمبلكس عموماً والتي يمكن تحديدها بالخطوات الآتية:

- خ١ : عمل جدول يمتلك حلاً أساسياً ابتدائياً.
  - خ٢ : تحديد المتغير الداخل والخارج والعنصر المحوري.
  - خ٣ : عمل جدول سمبلكس لاحق بالاستفادة من العنصر المحوري.
  - خ٤ : اختبار أمثلية الحل الممكن باعتماد القاعدة:
- إذا كانت الدالة Maximize وكان  $all Z_j - i_j \geq 0$  فذلك يعني توصلنا إلى الحل الأمثل النهائي.
  - إذا كانت الدالة Minimize وكان  $all Z_j - i_j \leq 0$  فذلك يعني توصلنا إلى الحل الأمثل النهائي.

فإذا تم الحصول على إجابة نعم في خ٤، نتوقف. وإلا نعاود الحل اعتباراً من

خ٢.

ومن المعلوم أنه في حالة عدم استطاعتنا تحديد المتغير الداخل فذلك يعني الحل غير ممكن No Feasible Solution ، وهي حالة خاصة في البرمجة الخطية. وقد لاقت البرمجة الخطية استخداماً واسعاً في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والصحية والمؤسسات الربحية والإنتاجية وقُدِّم العديد من النماذج التطبيقية في مجال التخطيط والإنتاج والسيطرة النوعية والجدولة والتخصيص والنقل واستطاعت البرمجة الخطية تقديم الكثير من الحلول العلمية والعملية التي لاقت ترحيباً من قبل الإدارات القائمة على هذه المؤسسات ومتخذي القرار فيها.

## ٢. المعوقات والمشاكل في البرمجة الخطية

إن ما يعاب على أنموذج البرمجة الخطية حالياً وجود مجموعة من المحددات والمشاكل والمعوقات سواءً في مراحل الصياغة أو النمذجة أو الحل، كاحتوائها على دالة هدف واحدة Only One Objective Function موصوفة عامة بشكل تعظيم Maximize أو تصغير Minimize تهتم غالباً بتعظيم الربحية أو تدنية التكاليف، واعتمادها شرط الخطية Linearity الواجب توافره في دالة الهدف والقيود واستمرارية Continuous متغيرات القرار قيد الحل فيها.

أما المشاكل التي تعانيها عند إيجاد الحل فيمكن إبراز أهمها وهو عدم وجود حل ممكن No Feasible Solution، وكذلك من المأخذ عليها تقديمها لحل أمثل وحيد Unique Optimal Solution ذي مفهوم اقتصادي غالباً (تعظيم أرباح Maximize Profit) ليس على متخذ القرار إلا القبول به أو رفضه. والذي كان هو المعيار الوحيد للحكم على كفاءة المؤسسة أو القطاع أو النظام قيد التحليل والدراسة.

أما الآن فتعد الربحية الاقتصادية ليست هي المعيار الوحيد للحكم على أمثلية النظام *Optimality of System*، بل تطور الأمر بالاعتماد على تعددية المعايير *Multiple Criteria* للحكم على أداء النظام ومدى أمثليته وظهور ما يسمى باتخاذ القرارات تحت عدة معايير *Multi - Criteria Decision Making* والمعروفة حالياً باختصار *MCDM*.

وأخيراً وليس آخراً عدم قدرة أنموذجها العام على التمثيل الكفوء والواقعي للأنظمة الكبيرة والمعقدة مقارنة بالنماذج الحديثة المقدمة من قبل البرمجة الرياضية المتعددة الدوال *MOMP* في العقود الثلاثة الأخيرة.

أما سكونية (ثبوتية) أنموذجها العام فما زال عائقاً اتجاه دخولها في تطبيقات المخاطرة *Risk* وعدم التأكد *Uncertain* والعشوائية *Stochastic*. وستبقى البرمجة الخطية وعلى الرغم من كل ما قيل هي الأساس وإن كل ما يجري هو تطور وتوسع في أنموذجها العام المعروف لدى الجميع.

### ٣. التطورات في البرمجة الخطية

بناء على ما ذكر تم تقديم العديد من المقترحات والنماذج التي طورت الأنموذج العام للبرمجة الخطية التقليدية وطرائق الحل فيه فظهرت النماذج اللاخطية *Non-Linear Programming* لتجاوز شرط الخطية، وظهرت نماذج البرمجة العددية الصحيحة *Integer Programming* لتوسيع نوع المتغيرات قيد الدراسة من مستمرة إلى متقطعة وجاءت نماذج البرمجة الهدفية *Goal Programming* لتجاوز مشكلة عدم وجود حل ممكن وإعطاء مرونة أكبر وكفاءة أعلى لتمثيل وصياغة المشاكل الكبيرة والمعقدة وجاءت نماذج البرمجة الرياضية المتعددة الدوال *MOMP* المتنوعة لتجاوز مشكلة أحادية دالة الهدف في البرمجة الخطية وظهرت النماذج العشوائية *Stochastic Models* لتجاوز مشكلة السكونية.

ذكرنا سابقاً بشكل موجز بعض أهم المحددات والمعوقات والمشاكل الخاصة بالبرمجة الخطية وطرق الحل فيها ومن ثم ذكرنا أهم التطورات التي جرت لتجاوز هذه العقبات وفي هذا البحث سنتقصر دراستنا النظرية والعملية على جانب واحد من هذه التطورات ألا وهي تعددية الدوال *Multi - Objective* لتجاوز مشكلة أحادية دالة الهدف في أنموذج البرمجة الخطية التقليدي من خلال تقديم أنموذج البرمجة الخطية المتعدد الدوال *MOLP* وطرائق الحل فيه لاحقاً مع الإشارة إلى وجود نماذج أخرى خارج نطاق بحثنا هذا.

أما عن التطورات الحاصلة في طرائق حل نماذج البرمجة الخطية فلا بد من الإشارة إلى الانتقال من السمبلكس الاعتيادية *S.M.* إلى المعدلة *R.S.M.*، ومن ثم ظهور السمبلكس ذات الوجهين *Tow Phase S.M.*، ومن ثم حالياً ظهور ما يسمى بالسمبلكس المتعددة المعايير *M.S.M.* وتطورها أيضاً إلى *R.M.S.M.* وإلى *Two Phase R.M.S.M.* وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن طريقة السمبلكس هي ليست الأسلوب الأوحده في حل مشاكل البرمجة الخطية المعقدة والكبيرة الحجم والمتعددة

الدوال، بل هناك العديد من المقترحات والخوارزميات مثل Ellipsoid Algorithm For Linear Programming المعروفة باختصار (EA).

## ثانياً. نموذج البرمجة الخطية المتعددة الدوال Multiple Objective Linear Program Model

### ١. البرمجة الخطية المتعددة الدوال وأنموذجها العام

إن البرمجة الخطية المتعددة الدوال بوصفها أسلوباً Approach لا تختلف كثيراً من حيث الأدوات والغايات مقارنة بأسلوب البرمجة الخطية التقليدي المعروف لدى الجميع، إلا أنه أكثر توسعاً من خلال قدرة أنموذجها على احتواء عدة دوال هدف ذات أسبقيات محددة، وبهذا يمكن تعريف البرمجة الخطية متعددة الدوال بأنها "أسلوب للوصول بمتجه Vector من الدوال الخطية المعجمية إلى أقصى قيمة ممكنة Maximum Possible Value أو (أدنى قيمة ممكنة) بوجود مجموعة من القيود" أو "أنها أسلوب يهتم بتحقيق أمثلية Optimality متعددة المعايير Multi-criteria في ظل مجموعة من القيود" وبهذا التعريف يبدو واضحاً التمييز الجوهرى MOLP مقارنة بـ LP بأنها "تحاول الوصول بالنظام قيد الدراسة إلى حالة الامثلية المتعددة المعايير أو الصفات وليست الامثلية الاقتصادية (الربحية) Optimality Econometric المتعارف عليها في نماذج البرمجة الخطية التقليدية (Zeleny, 1982, 218-279).

إن أول من قدم MOLP هو العالم Zeleny عام 1974 بكتابه Linear Multiple Objective Programming، ومن ثم قدم عام 1975 أول برنامج بلغة الفورتران يولد حلولاً غير سائدة Non Dominated Solution اعتماداً على طريقة السمبلكس المتعددة المعايير M.S.M، وفي عام 1976 قدم Yu and Zeleny التحليلات العلمية الخاصة بأنموذج MOLP. وفي عام 1977 قدم Isermann مجموعة من الحلول الكفوءة في MOLP، وفي عام 1978 قدم Cohon تغطية شاملة لها وفي عام 1979 قدم Hwang *et. al.* برنامجاً لحل مشاكل البرمجة الخطية المتعددة الدوال في المشاكل الكبيرة الحجم.

إن أنموذج البرمجة الخطية المتعددة الدوال يمكن تمثيله بعدة أساليب وبالشكل

الآتي:

التمثيل الجبري بالمصفوفات وكالاتي:

$$\max [C_{-1}^T X, C_{-2}^T X, \dots, C_{-L}^T X]$$

$$s.t. A X \leq b$$

$$X \geq O$$

والتمثيل بالعناصر يكون بالشكل الآتي:

$$\begin{aligned} \max \quad & f_1(x) = C_{11}X_1 + C_{12}X_2 + \dots + C_{1n}X_n \\ \max \quad & f_2(x) = C_{21}X_1 + C_{22}X_2 + \dots + C_{2n}X_n \\ & \vdots \\ \max \quad & f_l(x) = C_{l1}X_1 + C_{l2}X_2 + \dots + C_{ln}X_n \\ \text{S.t.} \quad & \begin{aligned} g_1(x) = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & \leq b_1 \\ & \geq \cdot \\ g_m(x) = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = h \end{aligned} \\ & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \end{aligned}$$

أو التمثيل الإحصائي وهو على النحو الآتي:

$$\max \quad f_i(x) = \sum_{j=1}^n c_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, L$$

S.t.

$$g_r(x) = \sum_{j=1}^n a_{rj}x_j \begin{cases} \leq \\ \geq \\ = \end{cases} b_r \quad r = 1, 2, \dots, m$$

$$x_j \geq 0 \quad \text{for all } j$$

إذ يحتوي الأنموذج على n متغير قرار و L دالة هدف و m من القيود. ويقترح الباحث التمثيل الآتي للتعبير عن أنموذج البرمجة الخطية المتعددة

الدوال:

$$\max \quad f = C \underline{X}$$

$$\min \quad f = D \underline{X}$$

$$\text{S.t.} \quad A \underline{X} \leq \underline{b}$$

إذ :

$\underline{X}$  : متجه المعاملات العمودي للأنموذج ذات الحجم (n×1).

C : مصفوفة المعاملات للدوال ذات حجم (L<sub>1</sub> × n) في حالة max.

D : مصفوفة المعاملات للدوال ذات حجم (L<sub>2</sub> × n) في حالة min.

A : مصفوفة المعاملات الفنية للقيود ذات الحجم (m × n).

بحيث إن L<sub>1</sub> + L<sub>2</sub> = L وهو عدد الدوال الكلية في الأنموذج.

لتبيان أن الدوال في نموذج MOLP يمكن أن تكون في حالة Max أو في حالة Min، وأن متغيرات القرار يمكن أن تكون مستمرة أو أعداداً صحيحة أو ثنائية أو محدودة. أما شرط إن الدوال ذات أسبقيات معجمية (تفضيلات معجمية) Lexicographically Priority فيمكن تعريفها كالآتي\*:

"لأي زوج من الصفوف المرتبة Two Order Arrays  $a = [ \dots a(n), a(2), a(1) ]$ ،  $b = [ \dots b(n), b(2), b(1) ]$  نقول  $a$  أفضل معجمياً (ذات أسبقية معجمية) من  $b$  إذا كان هناك ثابت  $k$  حيث:  $(k=1, 2, \dots, n)$ .

$a(k) < b(k) \ \& \ a(1) = b(1), a(2) = b(2), \dots, a(k-1) = b(k-1)$   
for any minimization objective . or  
 $a(k) > b(k) \ \& \ a(1) = b(1), a(2) = b(2), \dots, a(k-1) = b(k-1)$   
for any maximization objective . "

وهذا يقودنا إلى تعريف الأمثل المعجمي Lexicographically Optimal بأنه "أي حل لمشكلة البرمجة الخطية المتعددة الدوال MOLP يكون أفضل معجمياً إذا كان لا يوجد حل آخر أفضل معجمياً Lexi. Better، أفضل منه في الدوال (أو الأهداف) Objective (or goal) (المرتبة) الأسبقيات Prioritized (order). أما تعريف الحل الأمثل Optimal Solution الملائم لأنموذج البرمجة الخطية المتعددة الدوال فيمكن وصفه "حلاً ممكناً بأمثلية معجمية للأهداف"، أي "حلاً ممكناً إما أن يكون ذا تعظيم معجمي أو تصغير معجمي لدوال الأهداف".

## ٢. طرائق الحل لنماذج البرمجة الخطية المتعددة الدوال

إن طرائق الحل في نماذج البرمجة الخطية المتعددة الدوال عديدة ويمكن اعتبار طريقة السمبلكس المتعددة المعايير Multicriteria Simplex Method (M.S.M.) أهم وأبرز الطرائق المتبعة للحل يدوياً في المشاكل الصغيرة الحجم وطريقة السمبلكس الجبرية ذات الوجهين Two-phase Multicriterion Revised Simplex Method (Two-phase R.M.S.M.) أكثر الطرائق شيوعاً في برامج الحاسوب لحل المشاكل الكبيرة الحجم لما تمتلكه من مميزات.

وكلا الطريقتين تتبع الأسلوب نفسه الخاص بالسمبلكس القياسية Standard Simplex المعروفة في البرمجة الخطية التقليدية، وتختلف عنها بما يأتي:

١. توسيع صف المعيارية Row's Criteria إلى عدة صفوف Mult- Row Criteria لتناظر تعددية دوال الهدف في نموذج MOLP.

٢. يتم إيجاد الحل الأمثل أولاً للأسبقيات العليا (الخاص بالدالة الأولى  $f_1$ )، ومن ثم يتم الانتقال إلى الأسبقيات الدنيا (الخاص بالدالة الثانية  $f_2$ ) وهكذا.

\* إن متجه التفضيل المعجمي يكون بحجم متغيرات القرار  $(n)$  يعبر عن أن العلاقة ما بين المتجهين  $a$ ،  $b$  هي علاقة منطقية غير مقاسه تكون إما في حالة أصغر  $<$  أو في حالة أكبر  $>$ ، ولا يمكن أن يكون هناك أي ثابت وليكن  $k$  يمكن أن يغير أو يقلب هذه العلاقة.

٣. لا يجوز عند إيجاد الحل الأمثل للأسبوعية الدنيا التأثير سلبياً على ما تم تعظيمه أو تصغيره في الأسبوعية العليا.

أما من حيث تقنية الحل فهي كما هي تبدئاً بالحل الأساسي الابتدائي ومن ثم تحسين الحل بإيجاد حل ممكن أفضل، وهكذا حتى نتوصل إلى الحل النهائي الأمثل الذي لا يمكن إيجاد أفضل منه إطلاقاً.

وفيما يأتي خطوات خوارزمية M.S.M. واستخدامها في حل نماذج البرمجة الخطية المتعددة الدوال MOLP بإيجاز

خ<sup>1</sup>: إنشاء جدول سمبلكس ابتدائي.

خ<sup>2</sup>: حساب صف المعيارية  $Z_j - C_j$  لكل الدوال  $k = 1, 2, \dots, L$ .

خ<sup>3</sup>: نبدأ  $k = 1$  (أسفل الجدول).

خ<sup>4</sup>: اختيار المتغير الداخل.

• إذا لم يكن هناك اختيار. يعني الحل أمثل لـ  $k=1$ . نذهب إلى خ<sup>7</sup> (حالة نادرة جداً).

• إذا لم يتم الاختيار \* عدم وجود حل ممكن (حالة خاصة) \* توقف \*

• إذا تم الاختيار \* استمر \*

خ<sup>5</sup>: اختيار المتغير الخارج.

• إذا لم يتم الاختيار \* المشكلة غير محددة \* توقف \*

• إذا تم الاختيار \* استمر \*

خ<sup>6</sup>: اشتق حل لاحق (استناداً إلى العملية المحورية)

خ<sup>7</sup>: نختبر الأمثلية :

• الحل أمثل لجميع الدوال  $k = 1, 2, \dots, L$ . \* نتوقف \*

• الحل أمثل عند  $k=1$  فقط \* استمر إلى خ<sup>8</sup> \*

• الحل غير أمثل لـ  $k = 1$  \* اذهب إلى خ<sup>4</sup> \*

• لا يوجد حل ممكن \* نتوقف \*

خ<sup>8</sup>: ضع  $k = k + 1$

• إذا  $k < L$  \* اذهب إلى خ<sup>4</sup> \*

• إذا  $k = L$  \* توقف \*

والجدول الآتي يمثل الحل الأمثل النهائي في طريقة M.S.M. :

الجدول ١  
الحل الأمثل جبرياً لطريقة السمبلكس المتعددة المعايير

المتغيرات الأساسية الحالية	متغيرات أساسية	متغيرات غير أساسية	قيم المتغيرات الأساسية
	$X_1 \dots X_m$	$X_{m+1} \dots X_j \dots X_n$	
$X_1$	1 ..... 0	$Y_{1(m+1)} \quad Y_{1n}$	$X^o_1$
⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮
⋮	⋮ ⋮	⋮ $Y_{ri}$ ⋮	⋮
$X_m$	0 ... .. 1	⋮ ⋮	$X^o_m$
		$Y_{m(m+1)} \quad Y_{mn}$	
صفوف المعيارية	0 ..... 0	$Z_{1(m+1)} \quad Z_{1n}$	$f_{1(x^o)}$
	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮
	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮
	0 ..... 0	⋮ ⋮	$F_{L(x^o)}$
		$Z_{l(m+1)} \quad Z_{Ln}$	

المصدر: (Zeleny, 1982, 235)

إذ:  $r = 1, 2, \dots, m$  ،  $j = 1, 2, \dots, n$ 

### وفيما يأتي تفصيل فلسفي تحليلي لطريقة M.S.M.

نفترض أنه  $X^o$  حل غير منحل. وهذا يعني أن جميع المتغيرات الأساسية موجبة (الحل المنحل عندما يكون عدد المتغيرات الأساسية التي تظهر في الحل الأمثل أقل من عدد القيود، أو إن أحد المتغيرات الأساسية يساوي صفراً على الأقل في الحل النهائي الأمثل)، وبهذا تكون جميع المتغيرات الأساسية في متجه الحل الأولي ذات قيمة صفرية، في حين المتغيرات المضافة ذات قيم غير صفرية

$$أي: X^o = ( X_1^o, X_2^o, \dots, X_m^o, 0, 0, \dots, 0 )$$

S.t.

$$X_j = X_j^o > 0 \quad \text{for } j = 1, 2, \dots, m$$

$$X_j = 0 \quad \text{for } j = m+1, \dots, n$$

أما العدد  $Y_{rj}$  يعرف عند  $r = 1, 2, \dots, m$  ، و  $j = 1, 2, \dots, n$  فلزيادة  $X_j$  وحده واحدة يجب علينا التضحية بوحدات من القيم الحالية لـ  $Y_{rj}$  من القيم الحالية لـ  $X_r$ . ومن الواضح أن لجميع المتغيرات الأساسية  $j = 1, 2, \dots, m$  نجد:

$$Y_{rj} = 1 \quad \text{if } r = j$$

$$Y_{rj} = 0 \quad \text{if } r \neq j$$

لنفرض أننا نريد زيادة المتغير  $X_j$  بوحد واحدة فما هي التضحية في الحدود للدالة ذات التسلسل  $i$ ؟ إن زيادة  $X_j$  يعني أن المتغيرات  $X_1, \dots, X_m$  سوف تقلل

بـ  $Y_{ij}$ ، .....،  $Y_{mj}$  على التوالي. وستكون  $X_1, \dots, X_m$  هي المتغيرات الأساسية الحالية ومعامل دالة الهدف  $i$  هي  $C_{i1}, \dots, C_{im}$ .  
ولحساب القيمة الكلية المضحي بها ببساطة نضرب كل  $Y_{rj}$  بما يقابلها من  $C_{ir}$  والنتيجة يكتب:

$$\sum_{r=1}^m C_{ir} Y_{rj}$$

إلا أن كان حقيقة  $X_j$  زاد وحدة واحدة؟ ماذا سنحصل بهذه الزيادة في حدود دالة الهدف  $i$ ؟ وبهذا من الواضح أن  $C_{ij}$  هي العقدة المؤثرة في الدالة  $i$  بزيادة المتغير  $X_j$  وحدة واحدة وهي تحسب بالشكل الآتي:

$$Z_{ij} = \sum_{r=1}^m C_{ir} Y_{rj} - C_{ij}$$

وبهذا سيكون من الواضح جداً للمتغيرات الأساسية  $j = 1, 2, \dots, m$  جميع  $Z_{ij} = 0$  وكل هذا لسبب:

$$Y_{rj} = 1 \quad \text{if} \quad r = j$$

$$Y_{rj} = 0 \quad \text{if} \quad r \neq j$$

وهذا سيؤدي إلى:

$$\sum_{r=1}^m C_{ir} Y_{rj} = C_{ij} \quad \text{and} \quad C_{ij} - C_{ij} = 0$$

وبالتعاقب فإن المتغيرات الأساسية المشتقة في الحل الأساسي الحالي لا تستطيع تحسين قيمة دالة الهدف  $i$  لكن المتغيرات غير الأساسية تستطيع فعل ذلك مؤكداً.

إن القيمة الحالية لكل دوال الهدف  $L$  ممكن إيجادها مباشرة من الجدول ١ حيث:

$$f_i(X^o) = \sum_{r=1}^m C_{ir} X_r^o, \quad i=1, \dots, L$$

يشير لقيم دالة الهدف  $i$  عند الحل  $X^o$ . (Zeleny, 1982, 235). وهنا لا بد من القول لدخول متغيرات غير أساسية إلى المتغيرات الأساسية الحالية لا بد من وجود على الأقل قيمة  $Z_{ij} < 0$ ، وبهذا سيكون القيمة الكلية المضحي بها أقل من القيمة المستحصلة.

إن  $Z_{ij}$  تشير إلى كمية الزيادة في  $f_i(X^o)$  لكل وحدة بالزيادة في المتغير غير الأساسي  $X_j$ . وإذا  $Z_{ij} \geq 0$  لأي متغير غير أساسي، عندها قيمة  $f_i(X^o)$  حقيقةً سوف تزداد أو تبقى من دون تغير لكل وحدة زيادة في  $X_j$ .

العلاف [١٣٤]

وإذا  $Z_{ij} \geq 0$  لكل المتغيرات غير الأساسية  $j = m + 1, \dots$ ، عندها دالة الهدف المقابلة لـ  $f_i(X^0)$  وصلت إلى تعظيمها (حل أمثل)، ويعني ذلك لا يمكن تحسينها أكثر من هذا.

أما إذا  $Z_{ij} \geq 0$  لكل المتغيرات غير الأساسية، لكن على الأقل يوجد  $Z_{ij} = 0$  فهذا يعني أنه على الأقل يوجد حل أمثل بديل يعظم الحل. بقيت نقطة واحدة لأبد من توضيحها من قبل الباحث تخص كيفية الحصول على الحل الابتدائي لجدول السمبلكس الابتدائي، إذ سنجد:

أولاً- إذا كانت جميع القيود من النوع  $\leq$

عندها الحل سهل جداً نبدأ مع  $m$  متغير خامل Slack variable بجعلها متغيرات أساسية. وبالمقابل سيكون حينها كل متغيرات القرار غير أساسية أي تساوي صفراً. وبهذا يمكن القول إن M.S.M. تقدم الحل الأمثل لأنموذج MOLP المصاغ بالشكل الآتي تحديداً:

$$\text{Max } \underline{f} = C \underline{X}$$

$$\text{Min } \underline{f} = D \underline{X}$$

$$\text{s.to } A \underline{X} \leq \underline{b}$$

$$\underline{X} \geq \underline{o}$$

والمثال المبسط الآتي يوضح كل ما ذكر سابقاً تفصيلاً:

$$\text{Max } f_1 = 5X_1 + 8X_2$$

$$\text{Max } f_2 = 4X_1 + 15X_2$$

S.t.

$$10X_1 + 5X_2 \leq 200$$

$$4X_1 + 8X_2 \leq 200$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

وبهذا سيكون الحل التفصيلي لاستخدام M.S.M. فمثلاً بالجدول ٢.

## الجدول ٢

الحل التفصيلي باستخدام طريقة السمبلكس المتعددة المعايير

Basic Variable	5	8	0	0	R.H.S.
	4	15	0	0	
	$X_1$	$X_2$	$S_1$	$S_2$	
$S_1$	10	5	1	0	200
$S_2$	4	8	0	1	200
$f_2 \rightarrow Z_j - C_j$	-4	-15	0	0	0
$f_1 \rightarrow Z_j - C_j$	-5	-8	0	0	0
$S_1$	$\frac{60}{8}$	0	1	$-\frac{5}{8}$	75
$X_2$	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{8}$	25
$f_2 \rightarrow Z_j - C_j$	$\frac{28}{8}$	0	0	$+\frac{15}{8}$	375
$f_1 \rightarrow Z_j - C_j$	-1	0	0	1	200
$X_1$	1	0	$\frac{8}{60}$	$-\frac{5}{60}$	10
$X_2$	0	1	$-\frac{1}{15}$	$\frac{38}{240}$	20
$f_2 \rightarrow Z_j - C_j$	0	0	$-\frac{28}{60}$	$+\frac{205}{96}$	340
$f_1 \rightarrow Z_j - C_j$	0	0	$+\frac{8}{60}$	$+\frac{13}{12}$	210

المصدر: من إعداد الباحث.

وبهذا يكون الحل الأمثل المعجمي  $X_1 = 10, X_2 = 20$  مع:

$$\max f_1 = 210$$

$$\max f_2 = 340$$

هو الحل النهائي لأننا لن نستطيع الحصول على حل آخر أفضل، إلا بالإخلال بما تم تحقيقه للأسبقية العليا، وهذا واضح في صفوف المعيارية في الجدول السابق.

ثانياً - إذا كانت القيود من النوع  $=, \geq, \leq$

عندها لا بد من اللجوء إلى Two phase R. M.S.M. بإدخال المتغيرات الوهمية في جدول السمبلكس الابتدائي التي يجب التخلص منها في عمليات الوجه الأول one phase -، ومن ثم تكملته الحل بالوجه الثاني two - phase بالخطوات ذاتها التي ذكرت بطريقة (M.S.M.)، وبهذا التوضيح لا بد من القول إن Two M.S.M. phase R. تقدم حلاً أشمل من M.S.M. بتعميمها الأنموذج MOLP تحت المعالجة بما يأتي :

$$\text{Max } f = C \underline{X}$$

$$\text{Min } f = D \underline{X}$$

$$s.t. \quad A \underline{X} \begin{cases} \leq \\ \geq \\ = \end{cases} \underline{b}$$

وينوه الباحث للسبب المذكور آنفاً تعتبر أن Two phase R.M.S.M. والجبرية منها خاصة من أكثر الخوارزميات شيوعاً في برامجيات الحلول لنماذج MOLP لمميزاتها البرمجية الخاصة بخزن البيانات وأمور أخرى خارج نطاق بحثنا هذا\* . وسيتم دراسة وتوضيح طريقة Two - phase R.M.S.M. بالجانب العملي الممثل بالفقرة الآتية:

### الجانب العملي

ذكرنا في متن مشكلة البحث الحالة الدراسية التي سبق الأخذ بها تطبيقاً والمتمثلة "بوجود مستشفى أهلي تخصصي بالجراحة العامة يرغب متخذو القرار فيه بتعظيم أرباحهم من العمليات الكبرى كأسبقية أولى، ويرغبون بتدنية مجموع العمليات الصغرى كأسبقية لاحقة، وكذلك لديهم الرغبة بتعظيم أرباحهم من العمليات الوسطى كأسبقية أخيرة في ظل عدة قيود مفروضة عليهم، أهمها الكادر الطبي التخصصي وغرف العمليات وحجم الطلب". وفيما يأتي وباستخدام منهجية بحوث العمليات نعرض الخطوات التفصيلية للوصول إلى الحل النهائي للمشكلة:

**خ<sup>١</sup>: الصياغة:** إذ تم تحديد ما يأتي في هذه المرحلة:

١. **متغيرات القرار<sup>\*\*</sup>:** المراد إيجادها وتم تحديدها بمتغيرات القرارات الآتية:

$X1, X2, X3$  عدد العمليات الكبرى التي تجريها المستشفى بأنواعها الثلاث.

$X4, X5$  عدد العمليات الصغرى التي تجريها المستشفى بنوعها.

\* لمزيد من التفاصيل عن أهمية R.S.M. مقارنة S.M. أنظر: داود ، عربية عبدالرحمن، ١٩٨٨ .  
\*\* العمليات الكبرى (إزالة ورم، إزالة مرارة، استئصال كلية) والعمليات الوسطى (زائدة دودية، رفع لوزتين، زوائد أنفية) والعمليات الصغرى (فتح خراج، رفع غدة) على التوالي.

عدد العمليات الوسطى التي تجريها المستشفى بأنواعها الثلاث.

## ٢. دوال الأهداف (الأهداف)

- وتم تحديدها بشكل أسبقيات تفضيلية وكالاتي:
- الأسبقية الأولى: تعظيم أرباح المستشفى من العمليات الكبرى.
- الأسبقية الثانية: تدنية أعداد العمليات الصغرى.
- الأسبقية الثالثة: تعظيم أرباح المستشفى من العمليات الوسطى.

## ٣. القيود

وتم تحديد أبرز وأهم القيود المفروضة على العمل في المستشفى داخلياً وخارجياً كما يأتي:

- القيود الأولى: محدودية الكادر الطبي التخصصي الخاص بالعمليات الكبرى (ساعة).
- القيود الثاني: محدودية الكادر الطبي التخصصي الخاص بالعمليات الصغرى (ساعة).
- القيود الثالث: محدودية الكادر الطبي التخصصي الخاص بالعمليات الوسطى (ساعة).
- القيود الرابع: محدودية صالات العمليات الخاصة بجميع أنواع العمليات (ساعة).
- القيود الخامس: توقعات الطلب على العمليات الكبرى.
- القيود السادس: توقعات الطلب على العمليات الصغرى.
- القيود السابع: توقعات الطلب على العمليات الوسطى.
- القيود الثامن: توقعات الطلب على العمليات الوسطى من النوع الثالث فقط.
- مع ملاحظة\*: من المفضل مؤكداً أن تكون نتائج الحل للمتغيرات قيد الدراسة في حالة إعداد صحيحة، لأنها ستكون بذلك أكثر واقعية ووضوحاً بدلاً من عمليات التقريب، وبهذا تكون القيود المنطقية المضافة إلى الأنموذج هي ما يأتي:

*all xi are Integer*

$$all \quad x_i \geq 0$$

## خ٢ : بناء الأنموذج الرياضي

يرى الباحث أن التمثيل الرياضي الأمثل لمشكلة البحث المبين مفردات الصياغة فيه في خ<sup>١</sup> هو أنموذج برمجة خطية متعدد الدوال MOLP ذات أسبقيات معجمية Lox. Priority والذي يمكن اختزاله بالأنموذج الآتي :

\* تم استخدام طريقة التفرع والتحديد Branch and bound في إيجاد حلول الأعداد الصحيحة من قبل البرنامج المستخدم QSB. ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى برمجة الأعداد الصحيحة بأنواعها وطرائق حلها، وهي خارج نطاق بحثنا هذا بالرغم من الأخذ بها كقيد منطقي إضافي.

العلاف [١٣٨]

$$\max f_1 = C_1 X_1 + C_2 X_2 + C_3 X_3$$

$$\min f_2 = C_4 X_4 + C_5 X_5$$

$$\max f_3 = C_6 X_6 + C_7 X_7 + C_8 X_8$$

S.T.

$$a_{11} X_1 + a_{12} X_2 + a_{13} X_3 \leq b_1 \quad \dots\dots(1)$$

$$a_{24} X_4 + a_{25} X_5 \leq b_2 \quad \dots\dots(2)$$

$$a_{36} X_6 + a_{37} X_7 + a_{38} X_8 \leq b_3 \quad \dots\dots(3)$$

$$a_{41} X_1 + a_{42} X_2 + a_{43} X_3 + a_{44} X_4 + a_{45} X_5 + a_{46} X_6 + a_{47} X_7 + a_{48} X_8 \leq b_4 \quad \dots\dots(4)$$

$$X_2 + X_3 = b_5 \quad \dots\dots(5)$$

$$X_4 + X_5 = b_6 \quad \dots\dots(6)$$

$$X_6 + X_7 \geq b_7 \quad \dots\dots(7)$$

$$X_8 \geq b_8 \quad \dots\dots(8)$$

all  $x_i \geq 0$  and  $I$

وفيما يأتي التفاصيل الكلية للأنموذج:

$\max f_1$ : دالة تعظيم الأرباح لأنواع العمليات الكبرى.

$\min f_2$ : دالة تدنية الإنتاجية لأنواع العمليات الصغرى.

$\max f_3$ : دالة تعظيم الأرباح لأنواع العمليات الوسطى.

وإن:

$C_1, C_2, C_3$ : على التوالي تمثل ربح العملية الواحدة من أنواع العمليات الكبرى.

$C_4, C_5, C_6, C_7, C_8$ : على التوالي تمثل ربح العملية الواحدة من أنواع العمليات الوسطى.

$C_4, C_5$ : هي المعاملات الأحادية لأنواع العمليات الصغرى.

\* تستخدم المعاملات الأحادية في حالتين، إحداهما:

- عندما يراد تعظيم حجم الإنتاجية بغض النظر عن الأرباح أو التكاليف، وتكتب عادة رياضياً بالشكل الآتي:

$$\text{Max} f = \sum_{i=1}^n c_i x_i = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n, \quad \text{Such that } c_i = 1 \\ = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

- والأخرى عندما يراد تصغير حجم الإنتاجية من أنواع محددة من المنتجات (المتغيرات) حتى لو كانت منتجات خدمية، وتكتب عادة رياضياً بالشكل الآتي:

$$\text{M} \text{ inf} = \sum_{i=4}^5 c_i x_i = c_4 x_4 + c_5 x_5, \quad \text{Such that } c_4 = c_5 = 1 \\ = x_4 + x_5$$

في حين:

$a_{ij}$ : تمثل المعاملات الفنية الخاصة بالوقت المستغرق لكل عملية كبرى أو صغرى أو وسطى وبحسب نوع القيد.

$b_1, b_2, b_3$ : على التوالي تمثل مجموع الساعات المتاحة للجراحين الأخصائيين لجميع أنواع العمليات الكبرى والصغرى والوسطى.

$b_4$ : تمثل مجموع الساعات المتاحة لجميع أنواع العمليات في صالة العمليات الخاصة بالمستشفى.

$b_5, b_6, b_7, b_8$ : تمثل قيود الطلب المختلفة وعلاقتها بأنواع العمليات.

وبإدخال البيانات للأنموذج المصاغ يتكون لدينا الأنموذج التطبيقي الآتي:

$$\max f_1 = 140X_1 + 150X_2 + 120X_3$$

$$\min f_2 = 1X_4 + 1X_5$$

$$\max f_3 = 165X_6 + 145X_7 + 160X_8$$

S.T.

$$2X_1 + 1.8X_2 + 2.5X_3 \leq 35 \quad \dots (1)$$

$$0.75X_4 + 1.2X_5 \leq 25 \quad \dots (2)$$

$$1.4X_6 + 1.25X_7 + 1.4X_8 \leq 30 \quad \dots (3)$$

$$2X_1 + 1.8X_2 + 2.5X_3 + 0.75X_4 + 1.2X_5 + 1.4X_6 + 1.25X_7 + 1.4X_8 \leq 50 \quad \dots (4)$$

$$X_2 + X_3 = 10 \quad \dots (5)$$

$$X_4 + X_5 = 5 \quad \dots (6)$$

$$X_6 + X_7 \geq 8 \quad \dots (7)$$

$$X_8 \geq 2 \quad \dots (8)$$

all  $x_i \geq 0$  and  $I$

### خ 3 : إيجاد الحل للأنموذج

من الواضح جداً إن إيجاد الحل بطريقة M.S.M. يدوياً للأنموذج يحتوي على (3) دوال هدفية متعاقبة و(8) قيود و(8) متغيرات قرار) أمراً صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً.

وبهذا لا بد من استخدام الحاسوب لانجاز ذلك وأفضل الطرائق المحوسبة Two - Phase R.M.S.M. التي مر الكلام عنها نظرياً فيما سبق، ومن البرامج

---

= كما في أنموذجنا الحالي حيث يرغب متخذ القرار بتخفيض العمليات الصغرى بنوعيتها  $x_4, x_5$  بغض النظر عن التكاليف والأرباح.

العلاف [١٤٠]

الجاهزة الممكن استخدامها هو برنامج G P- I G P الموجود ضمن الحزمة البرمجية . Q S B . وعند إدخال البيانات الافتراضية للأنموذج على وفق أنموذج Matrix كانت المدخلات ممثلة بشكل ١ وكالاتي :

Variable	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Direction	R.H.S.
Max G1	1.0	1.0	1.0							
Min G2				1	1					
Max G3						105	145	100		
L1	2	1.8	2.5						≤	75
L2				0.75	1.2				≤	25
L3						1.4	1.25	1.4	≤	30
L4	2	1.8	2.6	0.75	1.2	1.4	1.25	1.4	≤	50
L5		1	1						≤	10
L6				1	1				=	5
L7						1	1		≥	8
L8								1	≥	2
Lower bound	0	0	0	0	0	0	0	0		
Upper bound	M	M	M	M	M	M	M	M		
Variable Type	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer		

الشكل ١  
مدخلات الأنموذج

وبعد حل الأنموذج كانت النتائج ممثلة بالشكل ٢ وعلى النحو الآتي:

ID	Decision Variable	Solution Value	Basis Status	Reduced Cost Goal 1	Reduced Cost Goal 2	Reduced Cost Goal 3
1	X1	7.00	basic	0	0	0
2	X2	10.00	basic	0	0	0
3	X3	0	at bound	-30.00	0	0
4	X4	5.00	basic	0	0	0
5	X5	0	at bound	0	0	0
6	X6	0.00	basic	0	0	0
7	X7	0	at bound	0	0	145.00
8	X8	2.00	basic	0	0	0
	Goal 1: Maximize G1 =	2,400.00				
	Goal 2: Minimize G2 =	5.00				
	Goal 3: Maximize G3 =	1,040.00				

الشكل ٢

### مخرجات المتغيرات والأهداف


وبتحليل نتائج الشكل ٢ الخاص بالحل النهائي نجد أن الحل الأمثل يمكن تمثيله

بمتجه:

$(7, 10, 5, 0, 8, 0, 2, \max f_1 = 2480\$, \min f_2 = 5, \max f_3 = 1640\$)$  وهذا يعني أن

المتغيرات  $X_8, X_6, X_4, X_2, X_1$  يمكن أن يكون لها قيم بديلة، وهي متغيرات ستبقى أساسية في أي حل نهائي بديل آخر، لكن  $X_7, X_5, X_3$  ستبقى ذات قيمة صفرية حتى في حلول أخرى.

أما نتائج القيود (Constraints Summary) فكانت بالشكل الآتي:



	Constraint	Left Hand Side	Direction	Right Hand Side	Stock or Branch	Shadow Price Goal 1	Shadow Price Goal 2	Shadow Price Goal 3
1	C1	32.00	=	75.00	3.00	0	0	0
2	C2	3.75	=	25.00	21.25	0	0	0
3	C3	34.00	=	20.00	16.00	0	0	0
4	C4	48.75	=	80.00	0.75	0	0	0
5	C5	10.00	=	10.00	0	150.00	0	0
6	C6	5.00	=	5.00	0	0	1.00	0
7	C7	8.00	=	8.00	0	0	0	0
8	C8	2.00	=	2.00	0	0	0	161.00

### الشكل ٣

#### مخرجات القيود

وبتحليل نتائج الشكل ٣ نجد أن القيود  $C_3, C_2, C_1$  الخاصة بالطاقات الإنتاجية

المتاحة للكادر الطبي التخصصي مازال يوجد فيها فائض يقدر بـ (3, 21, 16) ساعة عمل على التوالي. أما القيد الرابع والخاص بصالات العمليات لم يبق منه إلا أقل من 0.25 ساعة عمل، وهذا يعني أنه القيد الأكثر تأثيراً في الحل النهائي للأنموذج، ويمكن بزيادة طاقته استغلال كل الطاقات الفائضة في القيود  $C_2, C_1, C_3$ ، أما قيود الطلب  $C_5-C_8$  فنلاحظ إمكانية تلبيةها بالكامل.

#### خ ٤: اختبار حل الأنموذج

إن التحليلات الممكن إجراؤها للأنموذج ضمن الحزمة البرمجية QSB تشمل

القيود ودوال الأهداف أيضاً. ولو أخذنا تحليل القيد الأول على سبيل المثال لكان النتائج كالآتي:

Range	Goal Value	Goal Value	Goal Value	Goal G1	Goal G2	Goal G3	Learning Variable	Ending Variable
1	32.00	2,400.00	5.00	1,640.00	0	0	0	Resource Variable
2	35.00	2,400.00	5.00	1,640.00	0	0	0	Original Solution
3	M				0	0	0	Basic Variable

الشكل ٤  
تحليل القيود

وبتحليل نتائج الشكل ٤ يمكن أن نلاحظ أن الحل الأمثل النهائي للدوال  $(\max f_1=2480$,  $\min f_2 = 5, \max f_3 = 1640$)$ ، لن يتغير حتى لو جرى تصغير حجم القيد من 35 ساعة إلى 32 ساعة لوجود القيد الرابع  $C_4$  الأكثر تشدداً. ولو أخذنا تحليل المتغير الأول على سبيل المثال للهدف الأول تكون لدينا النتائج الآتية:$

Range	Coefficient of X1	Goal Value G1	Goal Value G2	Goal Value G3	Slack	Learning Variable	Ending Variable
1	M				0	0	Basic Variable
2	0	1,500.00	5.00	1,640.00	7.00	Slack_00_X1	X1
3	140.00	2,400.00	5.00	1,640.00	7.00	Original	Solution
4	M				7.00	Basic	Variable

الشكل ٥  
تحليل الأهداف والمتغيرات

وبتحليل نتائج الشكل ٥ الخاص بالأهداف والمتغيرات يمكن أن نلاحظ أنه بتغيير معامل  $X_1$  من 140 إلى 0 فإن هذا سيؤثر سلباً فقط في الهدف الأول  $G_1$  بخفض إجمالي الأرباح من 2480\$ إلى 1500\$، ولا تأثير له في الأهداف الأخرى  $G_2$  و  $G_3$ .  
أما جدول السمبلكس النهائي للمشكلة قيد الحل فكان كالاتي:

Linear and Integer Goal Programming																	
File Simplex Iteration Format Window Help																	
Final Simplex Tableau																	
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Slack_C1	Slack_C2	Slack_C3	Slack_C4	Surplus_C7	Surplus_C8	Slack_U8_X1	Slack
	Goal 1 Cj	140.00	150.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Goal 2 Cj	0	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basic	Goal 3 Cj	0	0	0	0	0	165.00	145.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Slack_C1	C1	0	0	0.70	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	-2.00
Slack_C2	C2	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0
Slack_C3	C3	0	0	0	0	0	0	1.25	0	0	0	1.00	0	0	1.40	0	0
Slack_C4	C4	0	0	0.70	0.45	0	1.25	0	0	0	0	0	1.00	0	1.40	0	-2.00
X2	C5	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X4	C6	0	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X6	C7	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X8	C8	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	-1.00	0
X1	U8_X1	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
Surplus_C7	U8_X6	0	0	0	0	0	0	-1.00	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0
Max Goal 1	(-Z)	0	0	-30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.00
Min Goal 2	(+Z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max Goal 3	(+Z)	0	0	0	0	0	0	145.00	0	0	0	0	0	0	160.00	0	0

الشكل ٦

## جدول السمبلكس النهائي

وبتحليل نتائج الشكل ٦ الخاص بجدول السمبلكس النهائي المستخرج نلاحظ أن الأمثلية للأسبقية الدنيا  $G_3$  هي أمثلية غير تامة، وإذا ما أردنا جعلها أمثلية تامة سيؤثر ذلك على ما تم إنجازه من أمثلية تامة في الأسبقيات العليا  $G_1$  و  $G_2$ ، وهذا هو جوهر ما يسمى بالحل غير السائد Non-Dominated Solution الذي يشكل حلاً أمثلاً لا يمكن تغييره نحو الأفضل إلا بالتأثير سلبياً على الأقل في إحدى الأسبقيات المنجزة العليا التي جرى تحقيق الأمثلية لها.

## خ 5: التطبيق والمراقبة

من المؤكد ستكون من مسؤولية إدارة المستشفى والمحلل الكمي المقترح للأنموذج المستخدم لمتابعة التغيرات الحاصلة سواء في أسبقيات دوال الأهداف أو القيود أو المعالم الفنية للأنموذج.

### الاستنتاجات

١. إن MOLP تعد أنموذجاً كفوءاً استحدثت لتمثيل المشاكل المتعددة الدوال خاصة الخطية منها.
٢. استحدثت نماذج MOLP لغرض الحصول على أمثلية معجمية متعددة المعايير وليست أمثلية أحادية الجانب.
٣. في التطبيق العملي كان الحل الأمثل المعجمي النهائي للأنموذج عامة هو:  
(7, 10, 0, 5, 0, 8, 0, 2, max f1 = 2480\$, min f2 = 5, max f3 = 1640\$)

### التوصيات

١. التمثيل للنماذج MOLP يعد كفوءاً في مشاكل القرار المتعددة المعايير التي يمكن أن توضع لها أسبقيات معجمية تفضيلية (قبل البدء بحل المشكلة قيد الدراسة).
٢. استخدام نماذج MOLP في ميادين الإنتاج والسيطرة النوعية والنقل والتخصيص وغيرها من الميادين.
٣. الحل بأسلوب Two – Phase R.M.S.M. يعد الأفضل، لأنه يعالج مشاكل ونماذج أكثر شمولية وأكبر حجماً.

### المراجع

#### أولاً- المراجع باللغة العربية

١. داود، عربية عبد الرحمن، "مقارنة نظرية وعملية بين طريقتي السمبلكس الاعتيادية والسمبلكس المعدلة مع تطبيق في مجال الصحة"، جامعة الموصل، ١٩٨٨.

#### ثانياً- المراجع باللغة الأجنبية

1. Barry Renderm Ralhp M. Stair, Jr. & Michael E. Hanna, "Quantitative Analysis for Management", 8<sup>th</sup>.ed., 2003, Prentice-Hall, New Jersey, USA.
2. C. L. Hwang, S. R. Paidy, K. Yoon and A. S. M. Masud "Mathematical programming with multiple objectives: A Tutorial", "Computer and Operation Research", 1980, Vol.7
3. Charles A. Gallagher & Hugh J. Watson, "Quantitative Methods for Business Decisions", 1980, McGraw-Hill, Inc., USA.
4. Wayne L. Winston. "Operation research: Applications and algorithm", 1994, Duxbury Press, U. S. A.
5. Zeleny, M., "Multiple Criteria Decision Making", 1982, McGraw-Hill, Inc., USA.