



اسم المقال: واقع جودة الخدمات الصحية وفق أنموذج منظمة الصحة العالمية: دراسة استطلاعية في المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل

اسم الكاتب: يسرى غازي حسن الطائي، ثائر أحمد سعدون السمان

رابط ثابت: <https://political-encyclopedia.org/library/3842>

تاريخ الاسترداد: 2025/05/14 18:11 +03

الموسوعة السياسية هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لاغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political، يرجى التواصل على

info@political-encyclopedia.org

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام

<https://political-encyclopedia.org/terms-of-use>

تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة تنمية الراشدین كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل ورفده في مكتبة الموسوعة السياسية مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي يتضمن المقال تحتها.





Journal of
TANMIYAT AL-RAFIDAIN
(TANRA)

A scientific, quarterly, international, open access, and peer-reviewed journal

Vol. 42, No. 137
March 2023

© University of Mosul |
College of Administration and
Economics, Mosul, Iraq.



TANRA retain the copyright of published articles, which is released under a "Creative Commons Attribution License for CC-BY-4.0" enabling the unrestricted use, distribution, and reproduction of an article in any medium, provided that the original work is properly cited.

Citation AL-Taee, Yousra G. H., Al-Samman, Thaeir A.S., (2023). "The reality of health care quality components: an exploratory study in government hospitals in the city of Mosul". **TANMIYAT AL-RAFIDAIN**, 42 (137), 217 -237 ,
<https://doi.org/10.33899/tanra.2020.165650>

P-ISSN: 1609-591X
e-ISSN: 2664-276X
tanmiyat.mosuljournals.com

Research Paper

The Reality of Health Care Quality Components: An Exploratory Study in Government Hospitals in the City of Mosul

Yousra G. H. AL-Taee¹ ; Thaeir A. S. Al-Samman²

^{1&2}College of Administration and Economics University of Mosul

Corresponding author: Yousra G. H. AL-Taee, University of Mosul –Department of Business Administration,

yousra.bap25@student.uomosul.edu.iq

DOI: <https://doi.org/10.33899/tanra.2023.177394>

Article History: Received: 24/8/2022 Revised: 15/9/2022; Accepted: 10/10/2022;
Published: 1/3/2023.

Abstract

The current research aims to know the reality of the quality of health care provided by government hospitals in the city of Mosul, using the World Health Organization model, represented by its following dimensions: (safety, equity, efficiency, effectiveness, patient-centered, timely). To achieve the aim of the research, the (descriptive-analytical approach) was used to collect and analyze the data distributed by the questionnaire, which is the main tool of the study., and the research sample was selected using the random method, and it included workers in hospitals (doctors, pharmacists, health professions, nursing staff) who are in direct contact with patients, and the research community consisted of six hospitals. Governmental (4 general, 2 specialized) was considered one of the largest hospitals in Nineveh Governorate and was selected based on the diversity of its specializations and capacity, in addition to the information obtained from documents and records of hospitals and their various departments, and for data and information processing, a set of statistical methods for statistical programs (SPSS. V:26) were used, and (AMOS V.25).

The research has reached a set of conclusions, including the variation in the level of availability of quality dimensions of health services in the surveyed hospitals. Excessive, and services should be based on the evidence base of patients and each patient's medical history and lead to improved health outcomes for individuals and communities based on their needs.

Key words:

Healthcare Service Quality, hospitals city of Mosul, World Health Organization model.

ورقة بحثية واقع جودة الخدمات الصحية وفق أنموذج منظمة الصحة العالمية: دراسة استطلاعية في المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل

يسري غازي حسن الطائي^١ ثائر أحمد سعدون السمان^٢

^١ قسم إدراة الأعمال - كلية الإدراة والاقتصاد-جامعة الموصل

^٢ قسم نظم المعلومات الإدارية ، كلية الإدراة والاقتصاد، جامعة الموصل،

المؤلف العاشر: يسري غازي حسن الطائي - قسم إدراة الأعمال ، كلية الإدراة والاقتصاد، جامعة الموصل،
yousra.bap25@student.uomosul.edu.iq

DOI: <https://doi.org/10.33899/tanra.2023.177394>

تاريخ المقالة: الاستلام: ٢٠٢٢/٨/٤؛ التعديل والتقييم: ٢٠٢٢/٩/١٥؛ القبول: ٢٠٢٢/١٠/١٠
النشر: ٢٠٢٣/٣/١.

المستخلص

يهدف البحث الحالي إلى معرفة واقع عناصر جودة الرعاية الصحية الذي تقدمها المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل وباستخدام أنموذج منظمة الصحة العالمية متمثلة بأبعادها الآتية: (الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض)، وتحقيق هدف البحث استخدم (المنهج الوصفي التحليلي) لجمع وتحليل البيانات الموزعة بواسطة الاستبانة، وهي الأداة الرئيسية للدراسة، وهو اختيار عينة البحث باستخدام الأسلوب العشوائي، وتضمنت العاملين في المستشفيات وهم (الأطباء، الصيادلة، المهن الصحية، الكادر التمريضي) ومنهم من تماش مع المرضي، وكان مجتمع البحث مكوناً من ست مستشفيات حكومية (٤ عامة، ٢ متخصصة) اُعدت من أكبر المستشفيات في محافظة نينوى، وتم اختيارها بناء على تفاصيلها وسعتها، فضلاً عن المعلومات التي تم استحصلها من وثائق وسجلات المستشفيات وأقسامها المختلفة، ولغرض معالجة البيانات والمعلومات تم استخدام مجموعة أساليب أحصائية خاصة بالبرامج الاحصائية (AMOS V.26) و(sps. V.25).

ولقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من ضمنها تباين مستوى توافق أبعاد جودة الرعاية الصحية في المستشفيات المبحوثة، واستناداً إلى ما وصل إليه البحث من استنتاجات فقد وضعت مجموعة من التوصيات كان من أهمها إن الرعاية الصحية المقدمة يجب تكون سليمة علمياً، وتقديم بشكل كاف بالنسبة للمريض ومن دون إفاظة، كما ينبغي أن تكون الرعاية مستندة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمرضى والتاريخ الطبي لكل مريض، وتؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للأفراد المجتمعات بناء على حاجاتهم إليها.

الكلمات الرئيسية

أنموذج منظمة الصحة العالمية، جودة الرعاية الصحية، مستشفيات مدينة الموصل.

مجلة

تنمية الرافدين

(TANRA): مجلة علمية، فصلية، دولية، مفتوحة الوصول، محكمة.

المجلد (٤٢)، العدد (١٣٧)،

نيسان ٢٠٢٣

© جامعة الموصل |

كلية الإدراة والاقتصاد، الموصل، العراق.



تحتفظ (TANRA) بحقوق الطبع والنشر للمقالات المنشورة، والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص (Creative Commons Attribution) (CC-BY-4.0) الذي يتيح الاستخدام، والتوزيع، والاستنساخ غير المقيد وتوزيع المقالة في أي وسيلة نقل، بشرط اقتباس العمل الأصلي بشكل صحيح.

الاقتباس: الطائي، يسري غازي حسن،
السمان، ثائر احمد سعدون، (٢٠٢٣). "واقع جودة الخدمات الصحية وفق نموذج منظمة الصحة العالمية: دراسة استطلاعية في المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل".
"تنمية الرافدين"، ٤٢ (١٣٧)، ٢٣٧-٢١٧،
<https://doi.org/10.33899/tanra.2020.165650>

P-ISSN: 1609-591X

e-ISSN: 2664-276X

tanmiyat.mosuljournals.com



المقدمة

لقد شهد العقدان الأولان من القرن الحادي والعشرين مجموعة من المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي أسهمت في صنع العديد من التحديات أمام منظمات الاعمال بقطاعيها العام والخاص، ومنها المنظمات المختصة بالرعاية الصحية، مما دفعها إلى ضرورة السعي إلى تطوير نفسها وتحسين جودة الرعاية التي تقدم إلى زبائنها. وتشكل تلك التحديات عقبات أمام المنظمات الصحية في كافة أنحاء العالم، لذا يحتم عليها التعامل معها بمسؤولية وحكمة، فمنها ما يتعلق بالتكلفة والجودة ، ونقص الموارد، ورضا المرضى سواء باحتياجاتهم أو توقيعاتهم و التكنولوجيا الحديثة سريعة التطور التي أسهمت في تطوير علاجات وفحوصات جديدة؛ وازدادت معها مطالب واحتياجات المرضى بشكل عام وتغير نمط الحياة؛ وازداد عدد السكان المتقدمين في العمر ، وبالتالي زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض متعددة ومعقدة (Winge et al., 2015, 289). وبالنظر للطلب المتزايد على الرعاية الصحية والذي تزامن مع ظهور (وباء كوفيد-١٩) وما تسببه من تعطيل للعمليات في الأنظمة الصحية ووضع قيود على خدمات تلك الأنظمة وقدرتها أصبح التحدي الرئيس الذي يواجه مقدمي الرعاية الصحية اليوم في كيفية تحسين جودة الرعاية الصحية وعملياتها لغرض استيعاب هذه المتغيرات المعقدة والمتسرعة وصولاً إلى تحقيق أهداف المؤسسات الصحية بتوفير العناية الملائمة للمريض المناسب في الوقت المناسب.

المبحث الأول : منهجة البحث

يقدم المبحث عرضاً لمنهجية للبحث المتمثلة بمشكلتها الفكرية والتي تشمل الكيفية التي صيغت من خلالها تساؤلات البحث، والأهمية المتوقع ان تصفيها وتحديد الأهداف المتواحة منها، وفرضيات البحث، حدود البحث، ومنهج البحث المعتمد وعلى النحو الآتي :

أولاً: مشكلة البحث

بعد ارقاء الرعاية الصحية في المجتمعات أحد الركائز الأساسية التي تعكس درجة تطور تلك المجتمعات، فإذا استطاعت المنظمات الصحية لمجتمع ما أن تحسن وبشكل دائم الخدمات الصحية المقدمة بما يتاسب مع مستوى طموح المواطنين، ويتحقق لهم متطلبات الرعاية الصحية الجيدة عندئذ سيحقق نجاحاً في المستوى نفسه في مجالات الحياة الأخرى.

والى يوم ونتيجة لمرور العراق بسلسلة من الحروب والمعاناة ازداد عدد المرضى من المواطنين وبحالات مختلفة من الأمراض وبالمقابل تعاني المستشفيات تدهوراً لمستوى الرعاية الصحية في ظل انخفاض مستوى الإمكانيات الصحية و الطبية والذي تمثل في النقص المستمر في الأدوية وبقية المستلزمات، فضلاً عن هجرة الأطباء . وأمام هذا النقص في الموارد البشرية والمادية ، برزت الحاجة إلى منهجيات واساليب حديثة ومتطرفة تعتمد خططاً وبرامج وتبني على مؤشرات دقيقة وصولاً لتحقيق الأهداف المطلوبة في تحسين الرعاية الصحية، ومن هذا المنطلق فإن تطبيق الجودة يعتبر جانباً مهماً، وذلك لارتباطها بجميع أوجه الاشطة الإنسانية ومنها قطاع



الرعاية الصحية. وتحقيقها في عمليات الرعاية الصحية لم يعد أمراً كمالياً بل هو ضرورة ملحة لاستمرار هذه العملية وجنى الثمار المرجوة منها.

من خلال المعطيات المذكورة أعلاه تبلور مشكلة البحث الفكري للتكامل مع مسارات المشكلة الميدانية التي تم تشخيصها من خلال الزيارات الاستطلاعية والمقابلات الشخصية مع الأفراد المبحوثين التي اجرتها الباحثان في المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل بغية تشخيص مدى ترسيخها لجودة الرعاية الصحية، فقد أصبح لنا أن الاهتمام بجودة الرعاية الصحية كان ضئيلاً، وحتى وإن كان قائماً فإنَّ استثمارها أو توظيفها لم يكن لصالح أداء المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل.

بناءً على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة عن طريق التساؤلات الآتية:

- ١- هل تبني المستشفيات المبحوثة جودة الرعاية الصحية بدلالة أبعاده ؟
- ٢- هل تصلاح أبعاد الأنماذج العالمي المكون من ستة أبعاد مرتبطة مع بعضها (الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض) لتمثيل بنية مفهوم جودة الرعاية الصحية؟

ثانياً:- أهمية البحث

تبع أهمية البحث الحالي من أهمية المواضيع التي تعالجه والميدان المختار للبحث، وتتجلى أهمية البحث في الآتي:

- ١- اعتماد أبعاد لم يتم تناولها في المنظمات الصحية العراقية (حسب اطلاع الباحثين) وكيف تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية ، والاضافة العلمية المهمة التي يمكن أن تقدمها لواقع المنظمات المبحوثة.
- ٢- للمنظمات الصحية ومنها المستشفيات أهمية في حياة المجتمعات، إذ إن المستوى الصحي الجيد لأفراد المجتمع يعد من الأهداف الأساسية لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول التي ترغب في بناء رأس مال بشري والمحافظة عليه وتنميته من أجل استخدامه في تحقيق أهدافها التنموية. لذا يستمد أهمية البحث في كونها تطبق في هذا القطاع الحيوي والمهم.
- ٣- لفت انتباه القيادات الإدارية في المنظمات المبحوثة وغيرها من المنظمات إلى ضرورة الإطلاع والتعرف على أبعاد هذه البحث في ضوء التغيرات البيئية المتتسعة، نظراً لما يمكن أن تُسهم به هذه المتغيرات عبر فهمها من تمكنها للتكييف وبما يتطابق مع متطلبات البيئة العراقية.

ثالثاً: أهداف البحث

يهدف البحث إلى التعرف على أبعاد جودة الرعاية الصحية وفقاً لأنماذج منظمة الصحة العالمية واختباره في المستشفيات الحكومية بمدينة الموصل، واعتماد على ذلك يمكن صياغة مجموعة من الأهداف تمثل بالآتي:

- ١- بناء إطار نظري وفلسي ومياني بمتغيرات البحث وأبعادها، عبر تتبع الجهود البحثية التي تعرضها الأديبيات المتخصصة.

- ٢- تحليل واقع أبعاد البحث الحالي وفق وجهات نظر المستجيب في المنظمات الصحية المبحوثة ووصفها وتشخيصها من خلال البيانات التي تم جمعها بواسطة استمارة الاستبيانة.



٣- توفير فهم أوسع وأفضل حول كيفية تطبيق عناصر جودة الخدمات الصحية في المنظمات الصحية المبحوثة والعمل على تطويرها بما يلائم البيئة التي تعمل فيها هذه المنظمات.

٤- تقديم مجموعة من التوصيات للمنظمات المبحوثة على ضوء النتائج التي سوف تتوصل إليها البحث بجانبها النظري والعملي من أجل تعديل دورها في البيئة التي تعمل بها.

رابعاً: فرضيات البحث

١- لا تتوفر أبعاد جودة الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في مدينة الموصل

٢- لا تتبادر أبعاد جودة الرعاية الصحية من حيث توافرها في المستشفيات الحكومية في مدينة الموصل

٣- لا يمكن تمثيل بنية مؤشرات القياس لجودة الرعاية الصحية بستة أبعاد متراقبطة مع بعضها تتمثل بـ(الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض).

خامساً: حدود البحث

تتمثل حدود البحث بالآتي:

١- حدود زمانية : تم انجاز الجانب النظري والعملي للبحث الحالية في الفترة (٢٠٢٢/١/٢٦) ولغاية (٢٠٢٢/٦/٣٠).

٢- حدود مكانية: تم تطبيق البحث في مجموعة من مستشفيات مدينة الموصل وكان عددها ست مستشفيات هي: "المستشفى الجمهوري التعليمي ، مستشفى ابن سينا التعليمي، مستشفى السلام التعليمي، مستشفى النساء التعليمي، مستشفى الموصل العام، مستشفى ابن الأثير".

٣. الحدود البشرية: وتتمثل في الأشخاص الذين تم توزيع الاستمارة عليهم، إذ تمثله عينة البحث من (أطباء، صيادلة، المهن الصحية، المهن التمريضية).

سادساً: منهج البحث

إنتمي الباحثان (المنهج الوصفي التحليلي) في البحث وذلك في جوانبها النظرية والميدانية، لتحقيق مما يتبعه هذه البحث في تحليل، ما يستلزم من البيانات وتحديداً استمار الاستبانة، فسيت توضيح أهم الخطوات التي تم اعتمادها في البحث وعلى النحو الآتي:

١- طرق جمع البيانات

إنتمي الباحثان نوعان من المصادر لجمع البيانات وهي:

أ- المصادر الثانوية: من خلال مراجعة الكتب والبحوث والدوريات والمؤتمرات والدراسات المنجزة ضمن المفاهيم العلمية التي ركزت عليها هذه البحث، فضلاً عن ما تتوفر من خلال شبكة الانترنت من مواضيع وبحوث تخص موضوع البحث.

ب- المصادر الأولية: نظراً لأن البحث يهدف إلى التعرف على واقع جودة الرعاية الصحية وفق أنموذج منظمة الصحة العالمية ولاتباع البحث الحالي "المنهج الوصفي التحليلي" اعتمد الباحثان على المقابلات الشخصية وكذلك استمار الاستبانة، إذ تعد الاستبانة أداة رئيسية لهذا البحث، وتعد من أكثر أدوات البحث العلمي



استعمالاً وتعتبر من أفضل الوسائل لجمع المعلومات عن مجتمع البحث وكذلك بسبب ملاءمتها لهذا البحث من حيث المجهود والإمكانات، استخدم الباحثان الأسساليب الإحصائية المناسبة.

٢- تصميم استماراة الاستبانة

والجدول (١) يوضح أبعاد متغير البحث (جودة الرعاية الصحية) والمصادر المعتمدة من قبل الباحثان في تصميم الاستبانة.

الجدول (١): مصادر تصميم فقرات الاستبانة

المصادر	الأبعاد الفرعية	المتغيرات الرئيسية
(Simms, 2017),(Friebel, 2018),(Braveman et al., 2018),(Culyer, 2019),(WHO, 2018),(Kehoe MacLeod, 2018), (Sreeramoju et al, 2020) (Fotovvat, 2019), (Senitan et al., 2019) (Busse et al., 2019) (Saver, 2006), (Mueller, 2019) (Institute of Medicine, 2001), (Araujo et al., 2020)	الامان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الرعاية المتمحورة حول المريض، الرعاية في الوقت المناسب	جودة الرعاية الصحية

المصدر: من إعداد الباحثين.

٣- أساليب التحليل الاحصائي

استعان الباحثان بمجموعة من الأساليب الإحصائية من أجل تحقيق أهداف البحث واختبار فرضياتها والتي تم تطبيقها باعتماد برمجة (AMOS V.25) (SPSS-V26) لغرض اجراء التحليلات والاختبارات الإحصائية المطلوبة وعلى النحو الآتي:-

- ١- (الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والنسبة المئوية، والتكرار) لوصف بيانات أبعاد البحث.
- ٢- (التحليل العاملی الاستکشافی) لفحص صلاحية حجم العينة ومدى ملاءمتها لإجراء التحليل، فحص تشعّب الاسئلة على الأبعاد.
- ٣- (التحليل العاملی التوكیدی) للتحقق من صدق مقياس البحث.
- ٤- تم تحليل بيانات البحث باعتماد برمجة (AMOS V.25) لاختبار العلاقات بين متغيرات وأبعاد الدراسة.

المبحث الثاني: الإطار النظري

• جودة الرعاية الصحية

أولاً: مفهوم جودة الرعاية الصحية

عرفت الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها "رافاهية بدنية وعقلية واجتماعية كاملة وليس مجرد انعدام المرض أو العجز" (Huber et al., 2011, 343). كما عرفت "جودة الرعاية الصحية" بأنها تلك الرعاية التي من المتوقع أن تتحقق أقصى قدر من الرفاهية للمريض مع مراعاة عملية تقديم الرعاية بجميع أجزائها (Donabedian, 2002, 23).

في حين اقتصرت التعريف المبكرة لجودة الرعاية الصحية على جهات نظر المهنيين والباحثين في مجال الرعاية الصحية. أصبح هناك اعترافاً متزايداً بأن تفضيلات وآراء المرضى والجمهور تتسم بأهمية بالغة وينبغي



اخذها بنظر الاعتبار في تعريف جودة الرعاية الصحية (Busse et al., 2019, 22). ويلخص الجدول (٢) بعض أكثر المفاهيم تأثيراً لجودة الرعاية الصحية في سياقات مختلفة.

الجدول (٢): تعريفات مختارة لـ(جودة الرعاية الصحية)

المفهوم	الباحثون والمؤسسات العالمية
الاكاديمية الوطنية للطب (١٩٩٠)	هي الدرجة التي تزيد بها الرعاية الصحية المقدمة للأفراد والسكان من احتمالات تحقيق النتائج الصحية المنشودة، وتتسق مع المعارف المهنية .(Institute of Medicine, 1990, 35)
المفوضية الأوروبية (٢٠١٠)	الرعاية الصحية ذات الجودة العالية هي الرعاية الصحية الفعالة والأمنة وستجيب لاحتياجات المرضى وتقضيّلاتهم. وتشير الورقة أيضاً إلى أن "الأبعاد الأخرى لنوعية الرعاية، مثل الكفاءة والوصول والعدالة، تعتبر جزءاً من نقاش أوسع نطاقاً ويجري تناولها في محافل أخرى" (European Commission, 2010, 64)
الهيئة الأمريكية المشتركة لاعتماد منظمات الرعاية الصحية للجودة (٢٠١٤)	بأنها "درجة الالتزام بالمعايير المعترف عليها لتحديد مستوى جيد من الممارسة ومعرفة النتائج المتوقعة لرعاية أو إجراء أو تشخيص أو معالجة مشكلة طبية معينة" (Tayeb, Juma, 2014: 103)
كريستنسن وأخرون (٢٠١٩)	"تحقيق مقاييس أداء العملية التي تعكس الإرشادات الوطنية للعلاج بالمستشفى ورعاية المرضى وإعادة تأهيلهم. كما ترتبط بتحسين النتائج الصحية للمرضى، بما في ذلك انخفاض معدل الوفيات وانخفاض مخاطر العودة للمستشفى"(Kristensen et al., 2019, 23).
أتيرتون (٢٠٢١)	"تتمثل في تقديم الرعاية الصحية في مجملها بمستوى واحد لجميع المرضى، كما تكمن في نجاح التدخل الطبي وعدم وجود مضاعفات أو عدوى مكتسبة، وفي مواقف العاملين في تقديم الرعاية الصحية وتعاطفهم والراحة التي يشعر بها المريض أثناء وجوده في المستشفى"(Atterton, 2021, 13)

المصدر: من إعداد الباحثين استناداً إلى المصادر الوردة في متنه.

وبالنظر لما سبق يرى الباحثان أن جهوداً عديدة قد بذلت لتحديد "جودة الرعاية الصحية" على مدى العقود الماضية، غالباً ما تم تأثيرها باستخدام مجموعة من الخصائص أو الميزات القابلة للقياس. ومع ذلك فإن كل مفهوم يقترب من الجودة من وجهة نظر محددة، ويتضمن منظور الكيان الذي يستخدم المفهوم وكيف سيتم تطبيقه وتقديره. ومن ثم فإن جودة الرعاية الصحية برأي الباحثين تتمثل بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية والاجتماعية عالية المستوى، والتي تدور حول المريض ومصممة لتلبية احتياجاته وتقضيّلاته الفردية، وتكون هذه الرعاية



آمنة وكفؤة وفعالة وفي الوقت المناسب وعادلة وصديقة للبيئة مع مراعاة الاحترام واللطف والرحمة في التعامل مع المريض.

ثانياً: عناصر قياس جودة الرعاية الصحية

في تقرير نشرته الأكاديمية الوطنية للطب سنة ١٩٩٩ بعنوان "الخطأ هو الإنسان"، ذكر أن ما يصل إلى (٩٨٠٠٠) شخص يموتون سنوياً نتيجة لأخطاء طبية من الممكن تقاديمها. وفي ضوء ذلك التقرير، تم جمع المهنيين الصحيين وصانعي السياسات الحكومية ومديري المؤسسات ومجالس الإدارات معاً، من أجل إنشاء نموذج من شأنه أن يمكن أصحاب المصلحة من الالتزام بتحسين وطني لنظام الرعاية الصحية ككل (Lerigo-, Sampson, 2019, 86)، اقترح هذا الأنماذج الخاص ستة أبعاد رئيسة تشكل رعاية صحية عالية الجودة : فاعلة وكفؤة ويمكن الوصول إليها وقت الحاجة وتركز على المريض وعادلة وآمنة. تم تسلیط الضوء على هذه الأبعاد في تقرير "عبور فجوة الجودة " بوصفها مكونات رئيسة لنظام الرعاية الصحية للقرن الحادي والعشرين (Baker, 2001, 5-6). كما اتفقت لجنة جودة الرعاية الصحية في "الولايات المتحدة الأمريكية" التابعة لمعهد الطب على أهمية هذه الأبعاد (Ballard, 2014, xv)، ولاحقاً اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم يجب أن تتمتع بالسمات الآتية كأبعاد للجودة : (آمنة، فاعلة، تتمحور حول المريض، في الوقت المناسب، كفؤة، عادلة) والتي يشار إليها عادةً باسم (STEEP World) (Health Organization, 2018, 67).

إن أي نظام لتقديم الرعاية الصحية يتميز بهذه السمات ستة سيكون مثالياً في تلبية احتياجات المرضى. إذ يخضع فيه المرضى لخدمات أكثر أماناً وموثوقية واستجابة وأكثر تكاملاً وتوافرًا (Tunçalp et al., 2015, 1046)، وسيكون مثل هذا النظام أيضاً أفضل للقائمين على تقديم الرعاية الصحية وجميع العاملين في المجال الصحي، مما يجعلهم يشعرون بالرضا عن تقديم رعاية أكثر موثوقية وأكثر استجابة للمريض وأكثر تسييقاً مما هو عليه اليوم (Busse et al., 2019, 290).

بناء على ما نقدم سيتم اعتماد نموذج منظمة الصحة العالمية، لأن تحقيق الجودة في الرعاية الصحية برأي الباحثين تتمثل بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية والاجتماعية عالية المستوى والتي تتمحور حول المريض ومصممة لتلبية احتياجات الفردية، وتكون هذه الرعاية آمنة وكفؤة وفعالة وفي الوقت المناسب وعادلة وصديقة للبيئة مع مراعاة الاحترام واللطف والرحمة في التعامل مع المريض، ومن النادر تناول هذه الأبعاد لقياس الجودة في بيئه المنظمات الصحية العراقية وفي مستشفيات مدينة الموصل على وجه التحديد وحسب اطلاع الباحثان. وسيتم تناول هذه الأبعاد بشيء من التفصيل وعلى النحو الآتي.

أ-بدأ الأمان: يعد بعد الأمان أحد الأركان الأساسية لجودة الرعاية الصحية؛ فهي نظام آمن يحمي علينا بيئه آمنة ولجميع المرضى في جميع عملياتها وطوال الوقت. ويعني معيار الأمان، أنه لا ينبغي أن يكون لدى المنظمات معايير رعاية متغيرة وأقل من المستوى المطلوب بإختلاف الأوقات مثلاً في المناوبات الليلية وعطلات نهاية الأسبوع أو أثناء أوقات التغيير التنظيمي وباختلاف المؤسسات في النظام الصحي (Herzer & Pronovost, 2021, 430).



يتعذر الوصول إليها أو تُنسى أثناء التحولات، كما تتوفر المعرفة حول المرضي - مثل حساسيتهم وأدويتها وخطط التشخيص والعلاج الخاصة بهم واحتياجاتهم الخاصة، مع ضمان سرية معلومات المرضى لجميع الذين يحتاجون إلى معرفتها، بغض النظر عن مكان وزمان مشاركتهم في عملية تقديم الرعاية (Tunçalp et al., 2015, 1046).

يتطلب ضمان سلامة المرضى أيضًا إبلاغ المرضى ومشاركتهم بشكل كامل. ولا ينبغي استبعاد المرضى وأسرهم في حالات عدم اليقين والمخاطر والخيارات في إجراءات العلاج. تعتقد الدراسات أن المريض المطلع هو أكثر أمانًا. وعند حدوث مضاعفات للمريض يجب أن يلتزم مقدمو الرعاية أخلاقياً بإبلاغ المريض بشكل كامل بالحدث وأسبابه، والمساعدة في التعافي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرارها (Schwendimann et al., 2018, 524).

بـ- مبدأ العدالة: على مدى العقدين الماضيين، تم استخدام مصطلح العدالة الصحية بوتيرة متزايدة في ممارسات وأبحاث الرعاية الصحية. وبالرغم من ان تعريفات هذا المصطلح تختلف على نطاق واسع (Braveman et al., 2018, 2) يمكن أن تختلف مبادئ العدالة في سياق الرعاية الصحية (Patel, 2017, 155). ويصف (Oliver & Mossialos, 2004, 657) ثلاثة مبادئ للعدالة الصحية:

١. المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لمن هم في حاجة متساوية لها.
٢. الوصول المتساوي للرعاية الصحية لمن هم في حاجة متساوية للرعاية الصحية.
٣. نتائج صحية متساوية / متكافئة.

العدالة هي مجال أساسي لجودة الرعاية الصحية وتشير إلى "عدم وجود فروق غير عادلة ويمكن تجنبها أو قابلة للتعديل في الصحة بين المجموعات السكانية المحددة اجتماعياً أو اقتصادياً أو ديمografياً أو جغرافياً"، والعدالة في الصحة تعني أن احتياجات الناس توجه توزيع فرص الرفاهية (Solar & Irwin, 2007, 54).

جـ- مبدأ الكفاءة: في عام ٢٠٠١ حددت الأكاديمية الوطنية للطب "الكفاءة" من بين أهدافها الستة لتحسين الجودة للخدمات الصحية وعرفتها على أنها "تجنب الهدر، ولا سيما إهدار المعدات والإمدادات والأفكار والطاقة" (Institute of Medicine, 2001, 52) (Institute of Medicine, 2001, 52). وبعد عقد من الزمن حددت منظمة الصحة العالمية الكفاءة كمقاييس لكمية و/ أو جودة المخرجات (النتائج الصحية أو الرعاية) لمستوى معين من المدخلات (التكلفة) (World Health Organization, 2010, 67) (World Health Organization, 2010, 67). ويلاحظ أن المفهوم الأخير يركز على المنظور الأوسع لـ "القيمة" في الرعاية الصحية، والذي من خلاله تأتي الفرص الأكبر لتحسين النتائج وخفض التكاليف (أي الإنفاق على الموارد) من خلال ضمان الاستخدام الشامل لموارد الرعاية الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لتلفي تطور المرض والتدخل المبكر عند حدوث المرض لتقليل الطلب في وقت لاحق على خدمات أكثر تكلفة وكثافة من حيث الموارد. على هذا النحو فإن المفهوم ينقل بشكل أفضل الفكرة القائلة "أنه من المتوقع أن تنخفض تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية والإنفاق مع تحسين الكفاءة" ، مع ذلك من المرجح أن يتطلب تحسين الكفاءة زيادة الإنفاق في مجالات معينة، مثل الاستثمارات الاستراتيجية في الرعاية الصحية الأولية،



وتقدير العجز المرتبط للمحددات الاجتماعية للصحة (SDOH) مثل انخفاض مستوى الإلام بالقراءة والكتابة وانعدام الأمان الغذائي ونقص وسائل النقل (da Graca et al., 2020, 137).

د- مبدأ الفاعلية: هو أن تكون الرعاية فاعلة سريرياً بمعنى أنها تستند إلى المعرفة العلمية ويتم تنفيذها لتعظيم فوائد المرضي ، وهذا يعني أن الطبيب يجب أن يستخدم الممارسة القائمة على الأدلة لتحديد ما إذا كان التدخل أو العلاج فاعلاً في تحقيق نتيجة أفضل للمريض بما في ذلك البديل المتمثل في عدم القيام بأي شيء (Institute of Medicine, 2001, 46). يتضمن ذلك الاختبارات التشخيصية أو مقاييس التشخيص أو الرعاية الوقائية أو المبادئ التوجيهية لأمراض محددة أو متعددة. كما يتضمن اعطاء الرعاية الطبية بطريقة فعالة وتتجنب الإفراط في استخدام الرعاية أو قلة استخدامها بطريقة من المرجح أن تسبب ضرراً أكثر من مساعدة المرضى (Senitan et al., 2019, 5).

هـ- مبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض : يعد مفهوم "الرعاية المتمحورة حول المريض" أحد مظاهر الاعتراف بأراء المستخدمين (المرضى). ويمكن القول إن التركيز على المريض كان دائماً محدداً رئيساً لجودة الرعاية الصحية. وينطوي التركيز على المريض على تقديم خدمات تتصف بأنها رحيمة يظهر فيها القائمون على تقديم الرعاية الصحية التعاطف مع مرضاهem، واحترام القيم والمعتقدات والتفضيلات الشخصية للمريض (O'Donnell, 2018, 7). تقترح منظمة الصحة العالمية (٢٠١٤) أن مصطلح "التركيز على الشخص" يساعد على توسيع التركيز من الحالة الصحية للشخص لمراجعة خياراته الشخصية ورفاهيته العامة وخلفيته الاجتماعية والثقافية، ويضمن أن يكون هناك توافق مع تفضيلات المريض بما يتعلق بعلاقة المريض بمقدم الرعاية ، وإمكانية الوصول إلى الرعاية ووسائل الراحة، وتأثيرات الرعاية وتكليفها (Araujo et al., 2020, 2).

ويتناول هذا البعد تجربة المريض مع المرض والرعاية الصحية والأنظمة التي تنجح أو تفشل في العمل لتلبية احتياجات المرضى الفردية (Institute of Medicine, 2001, 49). وهو مفهوم متعدد الأبعاد ولكن يصعب تحديده ويصعب قياسه ويهدف إلى مشاركة المناسبة للمرضى في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقليمي للخدمات الصحية. أما من وجهة نظر مقدمي الرعاية ، فإنه ينطوي على تقييم العملية نفسها وتطوير واستخدام المهارات التي تسمح بحدوث ذلك (Aldousari, 2015, 44).

و- مبدأ الرعاية في الوقت المناسب : تُعرف الأكاديمية الوطنية للطب حسن توقيت الرعاية الصحية بأنه "تقدير فترات الانتظار والتأخير الضار لكل من أولئك الذين يتلقون الرعاية والذين يقدمونها" (Institute of Medicine, 2001, 51). سواء حدث عدم الالتزام بالمواعيد في مرحلة التقييم (التشخيص) أو العلاج في الرعاية الصحية، فذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية. وقياس توقيت التأخيرات في الرعاية في سياق الرعاية الطارئة والعاجلة والحادية وتحت الحاجة والمزمنة بالثواني والدقائق وال ساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنوات، اعتناماً على مدى إلحاح الحالة الطبية (Harder & Chu, 2020, 109).

إن الخطوة الأولى للحصول على الرعاية في الوقت المناسب هي الحصول على الرعاية الطبية بمجرد الوصول إلى المؤسسة الصحية، ومع دخولنا منتصف القرن الحادي والعشرين، تضاءلت أوقات الانتظار في

مختلف الصناعات خارج قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد. حيث يوفر البيع بالتجزئة عبر الإنترن特 رعاية التوصيل إلى باب المنزل في غضون ساعة أو أقل، لقد غيرت التكنولوجيا توقعات الجمهور والتسامح مع أوقات الانتظار . وعلى الرغم من التحول الثقافي فإن فترات الانتظار الطبي الطويلة سواء كانت على الهاتف أو في مكتب الطبيب أو على نقالة المستشفى تبدو سمة ثابتة لنظام الرعاية الصحية في أغلب دول العالم (Herzer .(& Pronovost, 2021, 429

المبحث الثالث: الإطار الميداني

أولاً: وصف الأبعاد لجودة الرعاية الصحية وتشخيصها

اعتمد الباحثان على ستة أبعاد لقياس (جودة الرعاية الصحية) وهي : (الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض)، وذلك باستخدام (٣٦) سؤال ، علماً بأن عدد الاستثمارات الموزعة هو (٤٥٠) وإن الاستثمارات الصالحة كانت (٣٨٠)، ونتائج التحليل كما موضح في الفقرة الآتية:

الجدول (٣): التوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية وانحرافات المعيارية ونسب الاستجابة ومعامل الاختلاف

لمتغير أبعاد (جودة الرعاية الصحية)

سبة الإنجذبة %	معامل الانفتاح	معامل التمييز	معامل التحيط	معامل التحسين	مقاييس الاستجابة										نوع المؤشر	النوع
					(لا اتفق بشدة) (1)		(لا اتفق) (2)		(غير متأكد) (3)		(اتفق) (4)		(اتفق بشدة) (5)			
					%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#
68.11	39.44	1.34	3.41	13.16	50	10.79	41	26.05	99	22.37	85	27.63	105	Y1	نوع المؤشر	النوع
76.79	26.26	1.01	3.84	4.21	16	7.89	30	11.05	42	53.42	203	23.42	89	Y2		
68.47	42.62	1.46	3.42	16.84	64	20.53	78	7.63	29	26.58	101	31.05	118	Y3		
73.21	35.42	1.30	3.66	6.84	26	17.63	67	12.63	48	28.42	108	34.47	131	Y4		
75.05	32.12	1.21	3.75	3.42	13	18.42	70	12.11	46	31.58	120	34.47	131	Y5		
75.37	25.85	0.97	3.77	2.37	9	8.42	32	22.11	84	44.21	168	22.89	87	Y6		
69.16	38.86	1.34	3.46	9.74	37	19.74	75	14.21	54	27.63	105	28.68	109	Y7		
73.84	30.06	1.11	3.69	4.21	16	13.68	52	15.26	58	42.37	161	24.47	93	Y8		
68.95	30.61	1.06	3.45	4.21	16	13.42	51	32.89	125	32.37	123	17.11	65	Y9		
80.63	22.27	0.90	4.03	1.84	7	5.00	19	12.63	48	49.21	187	31.32	119	Y10		
77.11	22.34	0.86	3.86	1.32	5	4.47	17	23.95	91	47.89	182	22.37	85	Y11		
70.42	27.17	0.96	3.52	3.16	12	10.79	41	29.74	113	43.42	165	12.89	49	Y12		
76.21	24.05	0.92	3.81	1.84	7	7.11	27	20.79	79	48.68	185	21.58	82	Y13		
60.42	40.30	1.22	3.02	13.95	53	21.05	80	23.95	91	31.05	118	10.00	38	Y14	مبدأ الكفاءة	النوع



الطائي والسمان

نسبة الاستجابة %	معامل الانفاس	الأحرف المميزة	الوسط الصيادي	مقاييس الاستجابة										نوع المسؤول	نوع الأبعاد		
				(1) لا اتفق بشدة		(2) لا اتفق		(3) غير متأكد		(4) اتفق		(5) اتفق بشدة					
				%	#	%	#	%	#	%	#	%	#				
74.37	24.90	0.93	3.72	2.37	9	8.16	31	22.11	84	50.00	190	17.37	66	Y15	نوع المسؤولية الفاعلية		
71.84	28.30	1.02	3.59	3.68	14	11.58	44	23.42	89	44.47	169	16.84	64	Y16			
72.58	27.18	0.99	3.63	2.37	9	12.11	46	23.42	89	44.47	169	17.63	67	Y17			
70.26	27.70	0.97	3.51	3.16	12	10.00	38	34.47	131	37.11	141	15.26	58	Y18	نوع المسؤولية التحصوية حول الارتباط		
70.16	24.37	0.85	3.51	2.11	8	9.21	35	32.89	125	47.37	180	8.42	32	Y19			
75.00	23.22	0.87	3.75	2.11	8	7.37	28	18.68	71	57.11	217	14.74	56	Y20			
80.68	19.99	0.81	4.03	0.53	2	4.74	18	13.42	51	53.42	203	27.89	106	Y21	نوع المسؤولية التحصوية حول الارتباط		
56.79	45.74	1.30	2.84	20.00	76	21.58	82	24.74	94	21.84	83	11.84	45	Y22			
72.68	24.16	0.88	3.63	0.79	3	9.74	37	29.47	112	45.26	172	14.74	56	Y23			
73.32	26.53	0.97	3.67	2.37	9	9.74	37	26.05	99	42.63	162	19.21	73	Y24	نوع المسؤولية التحصوية حول الارتباط		
81.79	21.05	0.86	4.09	0.53	2	4.21	16	17.11	65	42.11	160	36.05	137	Y25			
77.16	23.07	0.89	3.86	1.84	7	4.21	16	23.95	91	46.32	176	23.68	90	Y26			
72.79	25.31	0.92	3.64	1.84	7	9.47	36	27.37	104	45.53	173	15.79	60	Y27			
67.05	30.67	1.03	3.35	5.00	19	13.68	52	35.00	133	33.68	128	12.63	48	Y28	نوع المسؤولية التحصوية حول الارتباط		
74.68	23.59	0.88	3.73	2.37	9	5.53	21	24.74	94	51.05	194	16.32	62	Y29			
62.63	38.24	1.20	3.13	10.53	40	21.32	81	25.53	97	29.74	113	12.89	49	Y30			
79.95	22.73	0.91	4.00	1.32	5	6.05	23	15.26	58	46.32	176	31.05	118	Y31	نوع المسؤولية التحصوية حول الارتباط		
76.53	21.50	0.82	3.83	1.84	7	4.47	17	19.47	74	57.63	219	16.58	63	Y32			
76.58	24.44	0.94	3.83	1.32	5	9.21	35	18.16	69	47.89	182	23.42	89	Y33			
63.74	38.74	1.23	3.19	8.95	34	24.21	92	23.42	89	26.05	99	17.37	66	Y34	نوع المسؤولية التحصوية حول الارتباط		
60.53	43.90	1.33	3.03	13.68	52	28.42	108	18.16	69	22.37	85	17.63	67	Y35			
60.79	41.62	1.26	3.04	13.68	52	23.68	90	20.79	79	28.68	109	13.16	50	Y36			
71.86	29.39	1.03	3.59	5.26		12.15		21.73		40.28		20.63		المعدل العام	نوع المجموع		
						17%		22%		61%				المجموع			

المصدر: من إعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل الاحصائي باستخدام البرمجية SPSS V26

يشير الجدول (٣) إلى أن إجابات الأفراد المبحوثين فيما يخص أبعاد جودة الرعاية الصحية من خلال العبارات (Y36 – Y1) كانت متوجهة نحو الاتفاق العام والبالغ (61%)، في حين كان الاتجاه السلبي (عدم الاتفاق) الإجابات الأفراد المبحوثين بمعدل قدره (17%)، فيما بلغت نسبة المحايدين (22%)، وعززت تلك المعدلات متوسط الأوساط الحسابية البالغ (3.59) وهو أعلى من الوسط الحسابي الفرضي البالغ (٣)، وبانحراف معياري قدره (1.03). كما بلغ متوسط نسبة الاستجابة إلى مساحة المقياس (71.86%) وهذه النسبة تقع ضمن المستوى الرابع (فوق المتوسط) من مساحة المقياس التي تؤشر إلى أهمية "أبعاد جودة الرعاية الصحية في المستشفيات المبحوثة"، ويعزز ذلك أيضا قيمة معامل الاختلاف التي بلغت (٢٩.٣٩٪) وهذا يدل على أن إجابات الأفراد المبحوثين على أسئلة هذا المتغير كانت إيجابية.

الجدول (٤): الأوساط الحسابية لأبعاد جودة الرعاية الصحية

المستوى	الوسط الحسابي	الأبعاد	ت
متوسط	٣,٦٢	مبدأ الامان	١
مرتفع	٣,٧١	مبدأ العدالة	٢
متوسط	٣,٥٥	مبدأ الكفاءة	٣
متوسط	٣,٥٦	مبدأ الفاعلية	٤
متوسط	٣,٦٣	مبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض	٥
متوسط	٣,٤٨	مبدأ الرعاية في الوقت المناسب	٦
متوسط	٣,٥٩	الإجمالي	

المصدر : الجدول من اعداد الباحثين.

وللإجابة على الفرضية الآتية: "لا توفر أبعاد جودة الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في مدينة الموصل". لابد من تحديد ثلاثة مستويات لتوافر أبعاد جودة الرعاية الصحية من وجهة نظر الأفراد المبحوثين هي

(مرتفع، متوسط، متدني) حيث تم تقسيم المتوسطات الحسابية على ثلاثة مستويات Al-Hawamdeh, Abu (2011: 1818).

مستوى متدنٍ: 2.33-1

مستوى متوسط: 2.34- 3.67

مستوى مرتفع: 3.68- 5

إذ حددت هذه المستويات من خلال احتساب علامة القطع بقسمة الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا على ثلاث درجات والتي تمثل عدد المستويات (Al-Hawamdeh, Abu Shatal, 2011: 1818) (3/1-5).

وتشير معطيات الجدول (٤) إلى الأوساط الحسابية لأبعاد جودة الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في مدينة الموصل، فعلى المستوى الإجمالي يلاحظ أن مستوى توافر هذا الأبعاد كان بمستوى متوسط حيث بلغ قيمة الوسط الحسابي الإجمالي (٣٠.٥٩)، وهذه القيمة كانت تتراوح في مستوى الحدود المتوسطة (٢٠.٦٧ - ٣٠.٦٧). مما يدل على أن أبعاد جودة الرعاية الصحية قد توافرت بشكل عام في المستشفيات المحبوبة ولكن بمستوى متوسط. وكذلك الحال في جميع أبعاد هذا المتغير عدا بعد العدالة كان بمستوى مرتفع وهذا مؤشر على أن البيئة المتوفرة في المستشفيات المحبوبة تشجع على العدالة.

مما يعني "رفض فرضية عدم وقوف الفرضية البديلة التي تنص على توفر أبعاد جودة الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في مدينة الموصل".

الجدول (٥): تباين تبني أبعاد جودة الرعاية الصحية من حيث توافرها في المستشفيات المحوسبة


المعطيات						
الترتيب	نسبة الاستجابة %	معامل الاختلاف %	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الاتفاق %	
الثانية	٧٢,٣١	٣٤,٣٧	١,٢٣	٣,٦٢	٦٢,٤١	مبدأ الامان
الأولى	٧٤,١٩	٢٦,٤٩	٠,٩٨	٣,٧١	٦٤,٦٨	مبدأ العدالة
الرابعة	٧١,٠٨	٢٨,٩٥	١,٠١	٣,٥٥	٦٠,٤٢	مبدأ الكفاءة
الخامسة	٧١,٢٧	٢٧,٣٩	٠,٩٥	٣,٥٦	٥٩,٥٥	مبدأ الفاعلية
الثالثة	٧٢,٦٨	٢٦,٩٩	٠,٩٦	٣,٦٣	٦٠,٩٦	مبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض
السادسة	٦٩,٦٨	٣٢,١٦	١,٠٨	٣,٤٨	٥٨,٠٣	مبدأ الرعاية في الوقت المناسب
	٧١,٨٦	٢٩,٣٩	١,٠٣	٣,٥٩	٦١,٠٠	المعدل

المصدر: من إعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل الاحصائي باستخدام البرمجية SPSS V26 بالنسبة لاسهامات الاتفاق لأبعاد جودة الرعاية الصحية من وجهة نظر الأفراد المبحوثين في مستشفيات مدينة الموصل والتمثلة بـ: (المستشفى الجمهوري التعليمي، مستشفى ابن سينا التعليمي، مستشفى السلام التعليمي، مستشفى النساء التعليمي، مستشفى الموصل العام، مستشفى ابن الاثير) يوضح الجدول (٥)، نسبة الاتفاق لكل بعد من أبعاد جودة الرعاية الصحية، وللاجابة على الفرضية الثانية: لا تباين أبعاد جودة الرعاية الصحية من حيث توافرها في المستشفيات الحكومية في مدينة الموصل . نلاحظ أن بعد مبدأ العدالة حق أعلى اسهامات الاتفاق وعلى نحو جعله في المرتبة الأولى مقارنة بالأبعاد الأخرى وبنسبة اتفاق (٦٤.٦٨٪)، بينما امتلك بعد مبدأ الامان المرتبة الثانية بنسبة اتفاق بلغت (٦٢.٤١٪)، وحصل بعد مبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض على المرتبة الثالثة وبنسبة اتفاق (٦٠.٩٦٪)، وفي المرتبة الرابعة جاء بعد مبدأ الكفاءة بنسبة اتفاق (٦٠.٤٢٪)، أما في المرتبة الخامسة جاء بعد مبدأ الفاعلية وبنسبة اتفاق (٥٩.٥٥٪) ، وفي المرتبة السادسة والأخيرة فقد جاء بعد مبدأ الرعاية في الوقت المناسب وبنسبة اتفاق (٥٨.٠٣٪). مما يدل على محدودية اهتمام المستشفيات المحوسبة بهذا البعد. وبالتالي رفض فرضية عدم وقوف الفرضية البديلة التي تنص على تباين أبعاد جودة الرعاية الصحية من حيث توافرها في المستشفيات الحكومية في مدينة الموصل.

ثانياً: التحليل العاملی التوکیدی

للغرض تمثیل بنیة مؤشرات القياس (أبعاد جودة الرعاية الصحية) استخدم الباحثان أسلوب التحلیل العاملی التوکیدی (CFA) ويدع هذا التحلیل أحد تطبيقات نمذجة المعادلة البنائیة (Structural Equation Modeling)، إذ اعتمد في تطبيق هذا الأسلوب على البرنامج الاحصائی (Amos V.25). وتنتمي أهمیة هذا التحلیل، في تحقيق الاجابة عن الفرضیة الآتیة: لا يمكن تمثیل بنیة مؤشرات القياس لجودة الرعاية الصحية بستة أبعاد متراپطة مع بعضها تمثل بمبدأ ب (الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلیة، الرعاية المتمحورة حول الزبون، الرعاية في الوقت المناسب). ولنفي هذه الفرضیة يجب أن تكون نتائج التحلیل ضمن حدود القبول لمؤشرات جودة المطابقة بحسب ما أشار اليها كل من McDonald & Ho, 2002 (Muthen & Kaplan), 1985 (Bentler, 1990)، كما يجب أن تتحقق قیم التشتبعثات الظاهرة على الأسماء ذات الرأس الواحد إزاء كل فقرة من فقرات أنموذج القياس الحدود المقبولة، والتي تمثل بحسب حجم عینة البحث الحالي ب (٠.٣٠) بحسب توصیات Hair et al., 2010, 116)، ويوضح الشکل (١)، والجدول (٨) نتائج التحلیل مع مقارنتها بحدود القبول:

الشكل (١) : نتائج المرحلة الأولى من التحلیل العاملی التوکیدی



المصدر: نتائج برنامج AMOS, V25


الجدول (٨): نتائج مؤشرات جودة المطابقة للمرحلة الأولى للتحلیل العاملی التوکیدی

المؤشر	قيمة المؤشر	المعيار (حدود القبول)	النتیجة
CMIN/DF	1.84	$CMIN/DF < 2 < 1$	مطابق
RMR	0.076	$RMR < 0.08$	مطابق
GFI	0.944	$GFI > 0.90$	مطابق
AGFI	0.936	$AGFI > 0.85$	مطابق
PGFI	0.821	(الأقرب إلى (١))	مطابق
NFI	0.920	$NFI > 0.90_0.95$	مطابق
RFI	0.913	$RFI > 0.90_0.95$	مطابق

المصدر: من إعداد الباحثين بالاستاد إلى نتائج AMOS, V25

من ملاحظة قيم التшибعات الموجودة على الأسهم ذات الرأس الواحد، نجد ان هناك اسئلة ذات قيم تشبع أقل من (0.30)، لذا يجب حذفها من الأنماذج وذلك من أجل الوصول إلى أعلى مطابقة ممكنة. أما فيما يتعلق بمؤشرات جودة المطابقة الموضحة في الجدول (٨) فقد ظهرت جميعها ضمن الحدود المقبولة، مما يعني أن عمليات التعديل على الأنماذج ستقتصر على حذف الأسئلة ذات التшибعات الضعيفة والمتمثلة بـ (Y2, Y3, Y4, Y5, Y6). ويوضح الشكل (٢) والجدول (٩)، نتائج التحليل العاملی التوکیدی في المرحلة الثانية:

الشكل (٢): نتائج المرحلة الثانية من التحليل العاملی التوکیدی



المصدر: نتائج برنامج AMOS, V25

الجدول (٩): نتائج مؤشرات جودة المطابقة للمرحلة الأولى للتحليل العاملی التوکیدی

المؤشر	قيمة المؤشر	المعيار (حدود القبول)	النتيجة
CMIN/DF	1.81	$CMIN/DF < 2 < 1$	مطابق
RMR	0.076	$RMR < 0.08$	مطابق
GFI	0.954	$GFI > 0.90$	مطابق
AGFI	0.946	$AGFI > 0.85$	مطابق
PGFI	0.826	الأقرب إلى (١)	مطابق
NFI	0.937	$NFI > 0.90_0.95$	مطابق
RFI	0.931	$RFI > 0.90_0.95$	مطابق



المصدر: من إعداد الباحثين بالاستناد إلى نتائج AMOS, V25

يلاحظ من نتائج التحليل العاملي التوكيدى في مرحلته الثانية، أن هنالك تحسناً في مؤشرات جودة مطابقة الأنماذج مع بيانات عينة البحث، بناءً على ذلك سيتم رفض الفرضية القائلة (لا يمكن تمثيل بنية مؤشرات القياس لجودة الرعاية الصحية بستة أبعاد متراقبة مع بعضها تمثل ب(الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض) وقبول الفرضية البديلة التي تنص (يمكن تمثيل بنية مؤشرات القياس لجودة الرعاية الصحية بستة أبعاد متراقبة مع بعضها تمثل ب(الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض).

المبحث الرابع الاستنتاجات والتوصيات الاستنتاجات

- ١- غالباً ما ركزت سياسات تحسين الرعاية الصحية على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية مع إهمال جودة تلك الرعاية . على افتراض أنه مع توسيع التعطية ستتحسن الجودة بشكل طبيعي ومع ذلك، هناك تأكيد متزايد بأن الناس قد يتصرفون بطريقة عقلانية تماماً عندما يتبنون استخدام الرعاية الصحية العامة ذات الجودة الرديئة وأن الجودة الرديئة للرعاية يمكن أن تكون عائقاً أمام التغطية الصحية الشاملة بغض النظر عن الوصول.
- ٢- أظهرت نتائج تحليل وصف أبعاد جودة الرعاية الصحية وتشخيصها أن المعدل العام لإجابات الأفراد المبحوثين بالاتجاه الإيجابي ما يؤكد أن المستشفيات المبحوثة تعمل على تعزيز جودة الرعاية الصحية بأبعاده الستة (الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض).
- ٣- حق بعد العدالة أعلى نسبة انفاق وفق آراء الأفراد المبحوثين في المستشفيات المبحوثة مقارنة بباقي الأبعاد، مما يفسر لنا اهتمام المستشفيات المبحوثة بهذا البعد للوصول المتساوي الرعاية الصحية لمن هم في حاجة للرعاية الصحية.
- ٤- شكل بعد مبدأ الأمان نسبة اتفاق فاعلة بشأن العبارات المعبرة عنه أذ محققاً المرتبة الثانية ، الأمر الذي يفسر لنا قدرة المستشفيات المبحوثة على توفير عوامل السلامة والأمان في منظماتها الصحية للمرضى والعاملين على حد سواء.
- ٥- حق مبدأ الرعاية المتمحورة حول المريض المرتبة الثالثة كم حيث نسبة الاتفاق، مما يدلل على أن المستشفيات المبحوثة تحاول تقديم خدمات تتصف بانها رحيمة يظهر فيها القائمين على تقديم الرعاية الصحية التعاطف مع مرضائهم، واحترام القيم والمعتقدات والتفضيلات الشخصية للمريض.
- ٦- حق مبدأ الكفاءة المرتبة الرابعة من حيث نسبة الاتفاق، ويمكن الاستدلال بأن تتجنب الهدر بما في ذلك هدر المعدات والموارد المادية وللوازم والموارد البشرية والأفكار والطاقة. وتؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للأفراد والمجتمعات.



جـ- فيما يخص بعد مبدأ الفاعلية حق المربطة الخامسة من حيث نسب الانفاق ، مما يدل على سعي المستشفيات المحبوبة لتقديم رعاية تمتاز باعتمادها معلومات موثقة ودقيقة وقائمة على الأدلة.

حـ- حق بعد مبدأ الرعاية في الوقت المناسب أقل نسبة انفاق من المبحوثين، مما يدل على أن الافتقار المستشفيات المحبوبة إلى التشخيص والعلاج في الوقت المناسب للحالات المزمنة إلى تحول الأمراض المزمنة إلى حالات طبية حرجة وعاجلة وطارئة، يؤدي الفشل في علاج الحالات الخطيرة والعاجلة والطارئة في الوقت المناسب إلى زيادة العبء على موارد الرعاية الحادة المحدودة، مما يؤدي في مرحلة معينة، إلى عدم القدرة على تشخيص الحالات الخطيرة وعلاجها في الوقت المناسب.

ـ٣ـ أوضحت نتائج تحليل حسن مطابقة أن أنموذج القياس المعتمد في البحث والمتضمن خمسة أبعاد أساسية جودة الرعاية الصحية والمتمثلة بعد "الأمان، العدالة، الكفاءة، الفاعلية، الوقت المناسب، الرعاية المتمحورة حول المريض" وهذا إشارة واضحة لأمكانية اعتماد هذا الأنماذج في قياس جودة الرعاية الصحية في المستشفيات المحبوبة.

الوصيات

ـ١ـ من الضروري الارقاء إلى المجالات ذات الأولوية الناشئة مثل تقليل الضرر في رعاية المرضى في سياق الرعاية الصحية وأخطاء التشخيص من أجل تعزيز عوامل الأمان في المستشفيات. وتطوير وتنفيذ الأدوات والاستراتيجيات التي تمكن المستشفيات من قياس وتقليل الضرر داخل وخارج المستشفى، بشكل مستمر وروتيني.

ـ٢ـ ان العدالة مكونٌ أساسٌ من عناصر الجودة ، لذا لا ينبغي المساس بالجودة على أساس الحالة الصحية للمريض، وان تتم معالجة عدم المساواة في تصميم الرعاية الصحية. رغم ذلك ان الرعاية الصحية العادلة أمر طموح ولكن ليس من السهل تحقيقه.

ـ٣ـ ضمان الاستخدام الشامل لموارد الرعاية الصحية وتقديم الرعاية الالزمة لتلافي تطور المرض والتدخل المبكر عند حدوث المرض لقليل الطلب في وقت لاحق على الرعاية الصحية بشكل أكثر تكلفة وكثافة من حيث الموارد.

ـ٤ـ إن الرعاية الصحية المقدمة يجب تكون سليمة علمياً وتقدم بشكل كاف بالنسبة للمريض ومن دون إفراط، كما ينبغي أن تكون الرعاية مستندة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمرضى والتاريخ الطبي لكل مريض وتحتوى إلى تحسين النتائج الصحية للأفراد والمجتمعات بناء على حاجاتهم لها.

ـ٥ـ من الضروري للقائمين تقديم الرعاية الصحية وأي رعاية أخرى تقريباً، الاستماع إلى مستخدمي الرعاية . وهذا مهم في سياق اتجاهات الرعاية الصحية المت坦مية التي تركز على المريض، وتمكين المريض، وزيادة مشاركة المريض. وبالتالي يعد المرضى من أصحاب المصلحة المهمين في العملية، وبعد الحصول على وجهات نظرهم جنباً إلى جنب مع وجهات نظر مقدمي ومديري الرعاية أداة مهمة لتحسين جودة الرعاية الصحية.



٦- يجب أن يحصل المرضى على الرعاية الصحية بمجرد الوصول إلى المنظمات الصحية، كما ينبغي تقليل فترات الانتظار والتأخير الضار لكل من أولئك الذين يتلقون الرعاية والذين يقدمونها، سواء حدث عدم الالتزام بالمواعيد في مرحلة التشخيص أو العلاج. لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية اعتماداً على مدى إلحاح الحالة الطيبة للمريض.

Referenec

- Aagja, J. P., & Garg, R. (2010). Measuring perceived service quality for public hospitals (PubHosQual) in the Indian context. *International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing*. Vol. 4 No. 1.
- Aldousari, A. (2015). Influence of national culture on the social construction of health care quality. *University of Surrey* (United Kingdom).
- Araujo, C. A., Siqueira, M. M., & Malik, A. M. (2020). Hospital accreditation impact on healthcare quality dimensions: a systematic review. *International Journal for Quality in Health Care*, Vol. 32 No. 8.
- Atterton, C. B. (2021). Quality Care in unequal Landscapes. The Meanings of Quality Healthcare in Humanitarian Settings. *The University of Manchester* (United Kingdom).
- Al-Hawamdeh, Nidal, and Abu Shatal, Mutassim (2011) The availability of organizational health dimensions and their impact on reducing sources of work stress, a field study on government sector doctors in Jordan" Yarmouk Research Journal, 27 (2), 1809-1829.
- Baker, A. (2001). Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century . *British Medical Journal Publishing Group*. Vol. 323, No. 7322
- Ballard, D. J. (2014). *The Guide to Achieving STEEPTM Health Care*: Baylor Scott & White Health's Quality Improvement Journey. CRC Press
- Braveman, P., Arkin, E., Orleans, T., Proctor, D., Acker, J., & Plough, A. (2018). What is health equity?. *Behavioral Science & Policy*, Vol. 4 No. 1.
- Busse, R., Klazinga, N., Panteli, D., Quentin, W., & World Health Organization. (2019). *Improving healthcare quality in Europe: characteristics, effectiveness and implementation of different strategies*. World Health Organization. Regional Office for Europe
- Busse, R., Klazinga, N., Panteli, D., Quentin, W., & World Health Organization. (2019). *Improving healthcare quality in Europe: characteristics, effectiveness and implementation of different strategies*. World Health Organization. Regional Office for Europe
- Da Graca, B., Fleming, N. S., & Ballard, D. J. (2020). Improving the Efficiency of Care. In *The Patient and Health Care System: Perspectives on High-Quality Care* , *Springer*, Cham. Vol. 31 No. 4.
- Donabedian, A. (2002). *An introduction to quality assurance in health care*. Oxford University Press.
- EC (2010). EU Actions on Patient Safety and Quality of Healthcare. European Commission, Healthcare Systems Unit. *Madrid: European Commission*.



- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E ,(2010), Multivariate data analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 7th ed, .
- Harder, S. J., & Chu, E. S. (2020). Timeliness of care. In The Patient and Health Care System: Perspectives on High-Quality Care, Springer, Cham. Vol. 109 No. 4.
- Herzer, K. R., & Pronovost, P. J. (2021). Ensuring quality in the era of virtual care. JAMA, Vol. 325 No. 5.
- Herzer, K. R., & Pronovost, P. J. (2021). Ensuring quality in the era of virtual care. JAMA, Vol. 325 No. 5.
- Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. v. d., Jadad, A. R., Kromhout, D., ... Smid, H. (2011). How should we define health? BMJ, Vol. 343 No. 2.
- Institute of Medicine (US). Division of Health Care Services, Institute of Medicine (US). Committee to Design a Strategy for Quality Review, Assurance in Medicare, & United States. Health Care Financing Administration. (1990). Medicare: a strategy for quality assurance, volume ii: sources and methods (Vol. 2). National Academy Press.
- Institute of Medicine. (2001). Crossing the quality chasm: A new health care system for the 21st century. Washington, DC: National Academy Press.
- Institute of Medicine. (2001). Crossing the quality chasm: A new health care system for the 21st century. Washington, DC: National Academy Press.
- Itumalla, R., Acharyulu, G. V. R. K., & Shekhar, B. R. (2014). Development of hospitalqual: a service quality scale for measuring in-patient services in hospital. Operations and Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 7 No. 2
- Juwaheer, T. D., & Kasseen, H. (2006). Exploring quality perceptions of health care operations: a study of public hospitals of Mauritius. Journal of hospital marketing & public relations, Vol. 16 No. 1.
- Juma, Tayeb. (2014). Measuring health care quality indicators from the perspective of patients, an exploratory study of a sample of patients at the University Hospital in Batna, Algeria
- Kristensen, P. K., Søgaard, R., Thillemann, T. M., Søballe, K., & Johnsen, S. P. (2019). High quality of care did not imply increased hospital spending—nationwide cohort study among hip fracture patients. International Journal for Quality in Health Care, Vol. 31 No. 4
- O'Donnell, B. A. (2018). Quality improvement, or quality care: an ethnographic study of frontline National Health Service staff engagement with a quality improvement initiative (Doctoral dissertation, University of the West of Scotland).
- Oliver A, Mossialos E. (2004) Equity of access to health care: outlining the foundations for action. J Epidemiol Community Health. Vol. 58 No. 4.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of marketing, Vol. 49 No. 4.



- Patel, A. (2017). Equity and Efficiency. In *Mental Health Economics*, Springer, Cham. Vol. 31 No. 4.
- Schwendimann R et al. (2018). The occurrence, types, consequences and preventability of inhospital adverse events – a scoping review. *BMC Health Services Research*, Vol. 18 No. 1.
- Senitan, M., Alhaiti, A. H., & Gillespie, J. (2019). Improving integrated care for chronic non-communicable diseases: A focus on quality referral factors. *International Journal of Healthcare Management*, Vol. 12 No. 2.
- Talib, F., Azam, M., & Rahman, Z. (2015). Service quality in healthcare establishments: A literature review. *International Journal of Behavioural and Healthcare Research*, Vol. 36 No. 3.
- Tunçalp, Ö., Were, W. M., MacLennan, C. (2015). Quality of care for pregnant women and newborns—the WHO vision. *BJOG: an international journal of obstetrics*, Vol. 122 No. 8.
- Winge, M., Johannesson, P., Perjons, E., & Wangler, B. (2015). The coordination hub: Toward patient-centered and collaborative care processes. *Health informatics journal*, Vol. 21 No. 4.
- World Health Organization. (2010). The world health report: health systems financing: the path to universal coverage: executive summary (No. WHO/IER/WHR/10.1). World Health Organization.
- World Health Organization. (2018). Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care.