



## مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

اسم المقال: استخدام "طريقة التحليل العاملي التبادلي C.F.A في دراسة انتشار بعض العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة" مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية  
اسم الكاتب: د. محمود محمد ديب طيوب

رابط ثابت: <https://political-encyclopedia.org/library/4123>

تاريخ الاسترداد: 2026/04/17 23:47 +03

الموسوعة السياسية هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسية - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على [info@political-encyclopedia.org](mailto:info@political-encyclopedia.org)

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسية - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام المتاحة على الموقع <https://political-encyclopedia.org/terms-of-use>

تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية - ورفده في مكتبة الموسوعة السياسية مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينصوي المقال تحتها.



## استخدام " طريقة التحليل العاملي التقابلي A.F.C في دراسة انتشار بعض العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة" مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية

الدكتور محمود محمد ديب طيوب\*

(تاريخ الإيداع 12 / 5 / 2008. قُبل للنشر في 26/11/2008)

### □ الملخص □

ركزت الدراسة على تقدير مستويات خمسة عناصر معدنية في 27 قرية في منطقة بانياس الساحل محيطة بمصفاة النفط والمحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية والعاملة على الفيول، وذلك من خلال تطبيق مخطط معانية يسمح لنا بجمع 135 = 27\*5 عينة ترابية ومن مستوى صفر الى 150 م ارتفاع عن سطح البحر، وتم استخدام أسلوب التحليل العاملي التقابلي AFC وبعض الاختبارات الإحصائية بهدف وضع إستراتيجية معانية وتحليل كمي للبيانات الإحصائية المختلفة لظاهرة التلوث الناجم عن تساقط الهباب المنبعث من مداخن المنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة العاملة على الفيول، وأظهرت الدراسة وجود ثلاث محاور للتلوث في المنطقة المدروسة هي: المحور الأول: ويمتد من المصفاة -عرب الملك-حريصون إلى محورته وتتصف هذه القرى بتلوثها بعنصر المنغيز ومصدره الأساسي مصفاة النفط المحور الثاني: ويشمل القرى المحيطة للمحطة الحرارية في الباصية باتجاه جنوب-شمال شرق: قرية الاوز-عرائيل-اوبين-الزللو-دير البشل-بلغونس وتتميز هذه القرى بتلوثها بشكل أساسي بعنصر الرصاص والكاديميوم المحور الثالث: مثل القرى الواقعة بين المحورين السابقين ويمتد من الباصية باتجاه الدعورية - المرقب وهي قرى ملوثة بعنصرين هما التوتياء والنحاس بشكل أساسي.

الكلمات المفتاحية: تحليل متعدد المتغيرات - تحليل عاملي تقابلي- توزيع العناصر الثقيلة - التلوث - المعاينة الإحصائية

\* أستاذ مساعد - قسم الإحصاء والبرمجة - كلية الاقتصاد - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية .

## Utilisation Des Méthodes "A.F.C. Pour L'Étude Des Distributions Des Métaux Lourds, Produit Par Les Entreprise" Dans La Ville De BANIAS- SYRIE.

Dr. Mahmoud Tayoub \*

(Déposé le 12/ 5 / 2008. Accepté 26/11/2008)

### □ Résumé □

Le but de cet article, est, d'une part, d'expliquer comment interpréter les résultats de l'Analyse Factorielle des Correspondances AFC, et d'autre part, de mettre à priori, un plan d'échantillonnage et un plan du traitement statistique et quantitatif des données obtenues sur cinq éléments chimiques sont: Zn, Mn, Cd, Cu & Pb, dans la région située autour de la raffinerie du pétrole et la station thermique à Baniyas, au sud de Lattaquié (27\*5=135 ECHANTILLES). Pour que nous puissions établir une cartographie des concentrations des éléments chimiques chez les habitants, les animaux, dans les plantes ainsi que dans le sol et dans les eaux potables en particulier. Les résultats obtenus nous permettent d'établir trois axes de la pollution qui sont: Axe1: étaler à partir de la station thermique à Bassai en direction de Arab El Melk-Alzahraa. Cet axe est pollué essentiellement par Mn. Axe2: contient essentiellement les sites: Al Oize- Almanzlé-Oubin- Al Zello. Cet axe est pollué par les Cd et Pb. Axe3: contient les sites intermédiaires entre les axes qui sont Al Markbe et Al Daatoriai zone polluée par les Zn et Cu.

**Mots- clés:** Analyses multi variables- Analyses Factorielle des Correspondance – Distribution des métaux lourds- pollution – Echantillonnage statistique

---

\* Maître de conférences, Département de Statistique & de Programmation, Faculté d'Economie, Université Tichrine

**مقدمة:**

البيئة كل ما يحيط بالإنسان، ويؤثر على حيات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من عوامل طبيعية وكائنات حية ومجتمع، ومن أهم عناصرها الماء والهواء والنبات والتربة والحيوان ، ومفهوم البيئة يقوم على أساس الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تناسق عناصرها المختلفة بما يضمن استمرارية التنمية على المدى البعيد ( العودات 1988؛ ابوشقرا 1994. تتطلب عملية التنمية استخدام المزيد من الموارد الحقيقية ( العمل ورأس المال والأرض....الخ ) واعتمادا على طبيعة هذه الموارد يتحدد تأثير التنمية على البيئة المحيطة من حيث تدهورها أو تلوثها أو كلاهما معا يعني يتدهور البيئة هو أن تفقد شيئا من إنتاجيتها أو كامل إنتاجيتها كفقد التربة لخصوبتها ونضوب مواردها وتلوث البيئة وأهم أنواع التلوث تلوث الهواء - التربة - المياه ... الخ وقد يكون هذا التلوث بالقدر الذي يستطيع معه المحيط امتصاصه خلال فترة زمنية قد تطول او تقصر ولكن إذا ما تراكمت لدرجة يصعب معها امتصاصه فإن أثاره ستكون سلبية على الوسط المحيط كافة بما في ذلك الإنسان (الحفار 1991) وإذا كان لا بد من هذا التأثير جراء عملية التنمية فعلى اقل تقدير يجب أن تكون في حدها الأدنى والذي يعني في الوقت ذاته المستوى الأمثل للتنمية وهذا ما يعرف **التنمية القابلة للاستمرار ( عبد الله 1994).**

**مشكلة البحث:**

يُعد القطاع الصناعي مستهلكاً هاماً للموارد الطبيعية الخام، ومساهماً فعالاً في تلوث الوسط الحيوي المحيط، حيث تؤثر مخلفات التصنيع وانبعاثاته على النظم البيئية في قطاعات عريضة، وإذا كانت بعض التأثيرات السلبية شراً لا بد منه، فإن خطورتها تتضاعف عند استخدام تقنيات غير ملائمة أو إهمال معالجة فضلاتها قبل طرحها إلى الوسط الخارجي (العودات، 1988). وتعد منشآت تصفية النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية مثل غيرها من البلدان من مصادر التلوث الجوي الهامة، كونها تطلق كميات كبيرة من الملوثات الخطرة والمتمثلة بالدرجة الأولى بأكاسيد الكبريت  $SO_2$  و  $H_2S$  والهيدروكربونات والعناصر المعدنية الثقيلة مثل الرصاص، الكاديوم، التوتياء، النحاس والمنغنيز... الخ كونها تستهلك كميات هائلة من الفيول الخام حيث ينطلق الجزء الأكبر من هباب الفحم من مداخن المنشآت المدروسة ومعلوم ان الفيول السوري يحتوي على 4 % كبريت ( موسى 1998؛ محمد سعيد وزملائه، 1979). وتكمن مشكلة البحث في:

- 1- دراسة دور مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل في تلوث المنطقة المحيطة بهذه المنشآت .
- 2- دراسة توزع وانتشار بعض العناصر المعدنية الثقيلة والناجمة عن تساقط هباب الفحم المنبعث من مداخن هذه المنشآت وتأثيرها على التربة والنبات والحيوان والصحة العامة وفي النهاية على العملية التنموية بشكل عام.

**أهمية البحث و أهدافه:**

يكمن الهدف من هذه الدراسة في نقطتين هما:

- **النقطة الأولى:** تهدف إلى دراسة توزع وانتشار العناصر المعدنية السامة في القرى المحيطة ببعض المنشآت الصناعية الثقيلة في المنطقة الساحلية (مصفاة النفط والمحطة الحرارية) بغرض وضع إستراتيجية معانية وتحليل إحصائي للبيانات البيئية، المتعلقة بتركز العناصر المعدنية المدروسة وهي التوتياء - النحاس - الكاديوم الرصاص والمنغنيز وتغيراتها في الزمن والمكان في مرحلة لاحقة
- **النقطة الثانية:** تكمن في وضع منهجية علمية لتحليل و تفسير نتائج التحليل متعدد المتغيرات لاسيما التحليل العاملية التقابلي AFC، لأن أبرز ما يهم الباحث هو كيفية التوصل إلى قراءة المخرجات، بما ينسجم وتحقيق الهدف من الدراسة والفرضيات أو التصورات الأولية للبحث، وهنا سنحاول إبراز أهم النقاط الواجب مراعاتها عند مراجعة مخرجات التحليل العاملية.

### فرضية البحث:


- توجد فروق دالة إحصائية بين تركيز العناصر المعدنية المدروسة والناجمة عن تساقط هباب الفحم فوق نقاط المعانية في المنطقة المدروسة.
- توجد فروق دالة إحصائية بين تركيز العناصر داخل محطة المعانية الواحدة وبين محطات المعانية المختلفة.

### وصف منطقة الدراسة:

إدارياً تقسم المنطقة الساحلية الى محافظتين هما اللانقية وطرطوس حيث يشكلان معاً 2.27 % مساحة القطر الإجمالية، أم من حيث عدد السكان يمثلان معاً 8.95 % من مجموع عدد السكان في القطر ( المجموعة الإحصائية لعام 2004). تكمن أهمية هذه المنطقة من موقعها الجغرافي، كونها تحتوي على مصادر هامة للثروة الوطنية حيث تنتج حوالي 79% من الحمضيات، 45% من الزيتون، وصناعياً تنتج أكثر من 65% من الإسمنت وتصفية حوالي 50% من النفط الخام. إضافة لما تتمتع به من خصائص طبيعية وأثرية وسياحية جعلتها قبلة المصطافين السوريين والعرب والأجانب. الأحوال المناخية السائدة متوسطة، تتصف بشتاء ممطر، وصيف جاف يتخللها فصولان انتقاليان، الرياح جنوبية أو جنوبية غربية. الغطاء النباتي السائد في المنطقة الساحلية معظمه من الشجيرات البرية " السنديان، البلوط، الزيتون البري، البلان... الخ أو النباتات العشبية الرطوبية: تتراوح بين 60-80% الحرارة تتراوح بين 14-21 درجة مئوية. ارتفاع منطقة الدراسة عن سطح البحر يتراوح بين صفر إلى 150 م. وضعها الطبوغرافي عبارة عن سلسلة من الهضاب منحدره باتجاه الغرب. تربتها عموماً تربة قليلة السماكة. صخورها كلسية، غطائها النباتي غير منتظم مما يعرض تربتها إلى عوامل الحت والتعرية.

### أداة البحث ومخطط المعانية:

استناداً على المواصفات الفيزيوكيميائية والغطاء النباتي لمنطقة الدراسة تم تحديد 27 نقطة معاينة تتسم بدرجة عالية من التجانس الداخلي، وضمن كل نقطة اختيرت بشكل عشوائي 5-6 نقاط تجريبية لجمع العينات الترابية، العينات جمعت على عمق يتراوح بين 0 إلى 60 سم انظر الشكل (1). وبذلك يكون مجموع العينات الكلية  $(27 \times 5 = 135)$  عينة ترابية ( FRONTIER, 1980; 1982 SCHERRER, 1984 ; ). وجميع العينات الترابية تم معالجتها مخبرياً في كلية العلوم بجامعة تشرين ومركز البحوث البحرية لإجراء المعايرة الكيميائية لقياس تركيز العناصر المدروسة وتم باستخدام جهاز الامتصاص الذري: Atomic Absorption with Flamm PYE Unicom S 1990 (عبد العزيز أسعد، 1988، أبو شقرا 1994 ، جون وزملائه 2003). تم تجميع البيانات (تركيز العناصر) وتهيئتها في جداول إحصائي ذو مدخلين بشكل إفرادي لكل عنصر على حدة أو بشكل تراكمي ... وفق مقاييس تبعاً للهدف ، حيث اتبع في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي وبشكل خاص التحليل العاملي التقابلي AFC لكل عنصر على حدة وبشكل إجمالي للعناصر كافة ولمزيد من الإيضاح لهذه التقنيات الإحصائية انظر: SOKAL & ROLF , 1981; BENZCRI, 1973; LEGENDRE & al,2003; CODARD, 2002; BERTHOUEX & al ,2002; CAZES,2004 ; ( 2006; STATITCF 1995 ) وتم استخدام حزمة البرامج المعدلة:



الشكل رقم (1) مخطط يبين نقاط المعاينة في منطقة الدراسة

## تحليل النتائج:

عندما نريد مقارنة موضوعين مع بعضهما بعضاً، يتوجب تحديد مقادير التشابه أو التباعد بينهما وهنا يمكن استخدام مقياس إقليدس أو توزيع كاي - مربع ( RENCHER,2002 ; LINCY,2003 ) والتحليل العاملية التبادلي AFC عبارة عن تحليل بطريقة المكونات الأساسي ACP على الأسطر وكذلك على الأعمدة، ونحصل بنتيجة هذه التحاليل على نفس القيم المميزة وبالتالي عددها الكلي يساوي: عمود (P-1) وسطر (n-1) : أي بمعنى آخر تساوي إلى :  $Info (n,p) - 1$  أما العوامل المميزة فكل قيمة مميزة مقترنة بعامل مميز وانطلاقاً من إحداثيات هذه العوامل والمحددة بواسطة معادلات المحاور وكل القيم المميزة تتراوح بين 0 و 1 وهي تمثل جزء من تباين سحابة نقاط الانتشار المفسر بواسطة المحور المقابل، فكلما اقتربت القيم المميزة من الواحد كانت نقاط الانتشار متباينة فيما بينها والعكس صحيح. وبشكل عام في التحليل العاملية التبادلي AFC تكون القيم المميزة قريبة من الصفر أكثر من الواحد، لكن إذا كانت المجاميع profifs متباينة، من المفضل استخدام الجذر التربيعي للقيم المميزة كمؤشر للتباين. أن أول قيمة مميزة تساوي 0.0559 وجذرها التربيعي يساوي 0.2364 وتُعد هذه القيمة بمثابة شاهد على شدة تشتت البيانات. إن جداء مجموع القيم المميزة T بالمجموع الكلي للبيانات، وفق قانون كاي مربع من أجل (n-1) (p-1) درجة حرية وطبقاً للفرضية الاستقلالية ما بين الأسطر والأعمدة كما يلي:

قانون كاي مربع = مجموع القيم المميزة × المجموع الكلي للبيانات = T نستطيع إذاً، قبل البدء في التحليل معرفة إذا كان هناك من علاقات أو روابط بين الأعمدة والأسطر، فالتحليل التبادلي يسمح بتحديد مصادر هذه العلاقات الكامنة بين الأسطر والأعمدة، نجد أن:  $T = 8124.67 \times 0.097 = 788.093$  وبمقارنة قيمة T بالقيمة النظرية لكاي مربع عند  $754 = (27-1) (30-1)$  درجة حرية والبالغة عند مستوى معنوية 1% قريباً من 300، نجد أن القيمة المحسوبة أكبر بكثير من القيمة النظرية، وبالتالي نرفض الفرضية الابتدائية ما بين الأسطر والأعمدة، أي أن هناك علاقة ارتباط بين الأسطر والأعمدة لجدول البيانات. أي أن هناك علاقة دالة مبدئياً بين نقاط المعانية وتوزع وانتشار العناصر المدروسة.

**التشبعات:** عبارة عن الارتباطات بين المتغيرات الأصلية والمحاور (العوامل)، كلما كبرت قيمة التشبعات دل ذلك على قرب ارتباط المتغير بعامله "محوره". (أبو عياش 1984) المعلومات الأكثر أهمية، تلك الممثلة بواسطة كل محور وهي عبارة عن ناتج قسمة كل قيمة مميزة على المجموع الكلي للقيم المميزة والتي تسمى بالجذور الكامنة وهي بالتعريف: عبارة عن قيم مربعات تشبعات كل المتغيرات على كل عامل، وتتناقص تدريجياً من العامل الأول إلى العامل الأخير، ويعتمد عليها في تحديد عدد العوامل "المحاور" التي نريد تزيد قيمتها عن الواحد والتي تسمى بنقطة القطع (VOLLE, 1981). جدول (1):

الجدول 1: القيم المميزة نسبة التباين المفسر والنسبة التراكمية:

المحاور	القيم المميزة	نسبة التباين المفسر %	النسبة التراكمية للتباين المفسر %
1	0.0559	48.2	48.2
2	0.0234	20.2	68.4
3	0.0074	6.4	74.8
4	0.0063	5.4	80.2
5	0.0040	3.5	83.7

يعد عدد القيم المميزة من المسائل الهامة في التحليل العاملي لأنها تحدد عدد العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار، وهذا الأمر يتعلق في إيجاد نوع من التوازن بين كمية المعلومات الضائعة وعدد المحاور الواجب أخذها فنلاحظ في الجدول رقم 1، أن هناك خمسة محاور تستخلص فقط 83.7% من التباين الكلي، من هنا يجب ملاحظة العوامل الأخرى المتبقية في حين نلاحظ في مثالنا التطبيقي أن هناك ثلاثة محاور تستخلص 97.9% من التباين المفسر كما في الجدول (2):

الجدول 2: القيم المميزة، نسبة التباين المفسر %، النسبة التراكمية

المحاور	القيم المميزة	نسبة التباين المفسر %	النسبة التراكمية للتباين المفسر %
1	0.0616	57.5	57.2
2	0.0370	34.5	92
3	0.0063	5.9	97.9

في حالة المثال الثاني يمكن الاكتفاء فقط بملاحظة المحورين الأول والثاني لأنهما يفسران أكثر 92% من التباين والباقي يفسر بواسطة المحاور الأخرى. بشكل عام، كلما ارتفعت قيمة التباين المفسر بواسطة المحاور الأولى يمكن الاكتفاء بها. وتوجد قاعدة قياسية تستند على استقلالية الصفوف والأعمدة عن بعضها البعض، ولكنها تشترك بنفس الأسلوب في تشتت سحابة نقاط الانتشار، فالجزء المفقود من التباين الكلي لكل منهما يمكن حسابه على نسبة مئوية كما يلي:  $100 / \text{Inf} (n, p)$  أي أن  $\text{Inf} (n, p)$  تمثل أقل عدد ممكن من الأعمدة والصفوف. واستناداً لذلك لا نراعي المحاور التي نسبة تباينها أقل من 3.7% و بالتالي نجد أن هناك أربعة محاور فقط يجب أن نراعيها انظر الجدول (1) وفي المثال الثاني نجد أن  $20\% = 100/5$  وبالتالي نلاحظ أن المحور الأول يستخلص 57.5% والمحور الثاني يستخلص 34.5% من التباين المفسر وبهذه الحالة يمكن الاكتفاء بالمخطط الهندسي الأول والثاني فقط لأنهما يمثلان حوالي 92% من التباين المفسر.

**الاشتراكيات:** عبارة عن مجموع إسهام المتغير في تشكيل العوامل التي يتم اشتقاقها، وتمثل أيضاً مقدار مساهمة المتغير في التباين الذي يتم تفسيره من خلال المحاور المأخوذة، ويعرف رياضياً بأنه مجموع مربعات تشبعات المتغيرات بالعامل المأخوذ، أي أنها جزء من التباين الكلي وتمكن التعبير عنه كنسبة مئوية لكل متغير من المتغيرات، وتحسب المشار للنقطة  $i$  في تشكيل المحاور  $\alpha$  بالعلاقة التالية:

$$\frac{F_{(x,i)}^2 x_i}{x_\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha} \quad \text{على المحور } \alpha \text{ باين النقطة } i \text{ على المحور } \alpha$$

حيث أن:  $F(i, \alpha)$  إحدائيات النقطة  $i$  على المحور  $\alpha$

يبين الجدول 3 معطيات المتغيرات في التحليل. العمود الثالث من الجدول يبين الاشتراكيات للمتغيرات في تشكيل المحاور العاملة الثلاثة الأولى، واستناداً لمفهوم المساهمات في مثالنا التطبيقي الأول والذي يمثل تحليل جداول أبعاده 72 قرية (نقطة معاينة) × خمس عينات من كل عنصر من العناصر المدروسة وهي: الرصاص - النحاس - الكاديوم - المنغنيز - التوتياء، الاشتراكيات الواجب ملاحظتها تلك التي تزيد عن 3.7% =  $100/27$ . فعلى سبيل المثال قرية الزهراء تساهم في تفسير 22.2% من التباين الكلي وبالتالي نلاحظ أن قيمة  $\text{Cos}^2$  كبيرة وقريبة من الواحد وهي تساوي  $\text{Cos}^2 = 0.846$  وذلك على المحور الأول. أما على المحور الثاني نرى أن قرية الزللو تساهم في تفسير 29.8% من التباين المفسر وبالتالي قيمة  $\text{Cos}^2 = 0.858$ . وهكذا بالنسبة للمتغيرات الأخرى. (جدول 3):

استخدام " طريقة التحليل العاملي التبادلي A.F.C في دراسة انتشار بعض  
العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة"  
مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية

طيوب

الجدول 3: يبين العمود 1 الإحداثيات 2 قيمة الـ  $\text{Cos}^2$  -3 الاشتراكات لنتائج التحليل العاملي لجدول بيانات أبعاده  $30 \times 27$

COLONNES			AXES PRINCIPAUX											
			المحور الأول				المحور الثاني				المحور الثالث			
			AXE 1				AXE 2				AXE 3			
			(1)	(2)	(3%)		(1)	(2)	(3%)		(1)	(2)	(3%)	
مصفاة النفط	CO	*	-0.143	0.0236	1.6	*	-0.174	0.350	5.6	*	-0.043	0.022	1.1	*
عرب المالك	AM	*	-0.213	0.396	3.8	*	-0.160	0.221	5.1	*	-0.117	0.119	8.5	*
مزرعة الحرية	LL	*	-0.290	0.783	6.1	*	-0.068	0.043	0.8	*	-0.052	0.025	1.5	*
حريصون	HR	*	-0.155	0.464	1.6	*	0.025	0.012	0.1	*	-0.043	0.036	0.9	*
قرقيص - الغابة	FR	*	-0.171	0.375	2.6	*	0.002	0.000	0.0	*	0.155	0.310	16.2	*
قرقيص 1	MH	*	-0.204	0.460	3.5	*	0.024	0.006	0.1	*	0.034	0.12	0.7	*
محوزته	MA	*	-0.169	0.503	2.3	*	-0.041	0.029	0.3	*	0.053	0.049	1.7	*
الزهراء	ZR	*	-0.561	0.846	22.2	*	0.093	0.024	1.5	*	-0.051	0.007	1.4	*
الزهراء 2	OK	*	-0.569	0.892	16.6	*	-0.025	0.002	0.1	*	0.027	0.002	0.3	*
الرياضية	BA	*	0.248	0.457	4.2	*	0.116	0.100	2.2	*	-0.140	0.145	10.0	*
الأوز	OZ	*	0.324	0.774	5.7	*	0.007	0.000	0.0	*	0.071	0.038	2.1	*
بعمرائيل	BM	*	0.282	0.767	3.9	*	0.054	0.028	0.3	*	0.080	0.061	2.3	*
الزللو	ZL	*	0.049	0.013	0.2	*	0.407	0.858	29.8	*	-0.016	0.001	0.1	*
شافي روح	CR	*	0.137	0.338	0.8	*	0.098	0.173	1.0	*	-0.028	0.015	0.3	*
بابلوطه	BB	*	0.284	0.507	4.8	*	-0.016	0.002	0.0	*	-0.025	0.004	0.3	*
بارمايا	BR	*	0.252	0.480	3.5	*	0.191	0.277	4.8	*	0.124	0.115	6.3	*
أوبين	OB	*	0.007	0.000	0.0	*	0.291	0.896	10.2	*	0.010	0.001	0.0	*
المنزلة	MN	*	0.087	0.080	0.4	*	0.260	0.716	8.9	*	-0.031	0.10	0.4	*
بستان	BSH	*	0.331	0.584	6.7	*	-0.168	0.151	4.1	*	-0.079	0.033	2.8	*

الحمام		*												
أبتلة	EB	**	0.128	0.222	1.1	*	-0.226	0.696	8.1	*	-0.022	0.007	0.3	*
دير البشل	DRB	**	0.218	0.346	4.0	*	-0.066	0.032	0.9	*	-0.200	0.293	25.3	*
مزيزع	MZR	**	0.150	0.247	1.6	*	-0.103	0.116	1.8	*	0.118	0.153	7.4	*
مزيزع 2	OMZ	**	0.010	0.005	0.0	*	-0.099	0.485	1.4	*	0.056	0.153	1.4	*
بلغونس	BLG	**	0.014	0.005	0.0	*	0.161	0.617	5.1	*	0.010	0.003	0.1	*
المرقب	MR K	**	0.129	0.313	1.0	*	0.062	0.071	0.6	*	0.045	0.038	0.9	*
الدغورية 1	DAA	**	0.114	0.171	0.8	*	-0.155	0.317	3.6	*	0.114	0.171	6.1	*
الدغورية	DAR	**	0.130	0.239	0.9	*	-0.168	0.399	3.7	*	0.065	0.059	1.7	*

دراسة أسطر جدول نتائج التحليل العاملي في الجدول 30×27:

بنفس الأسلوب تدرس صفوف جدول نتائج التحليل العاملي. فالاشتراكيات الواجب ملاحظتها تلك التي تزيد عن  $100/30=3.33$  على كلا المحورين في آن واحد انظر الجدول 4 الممثلة دراسة العناصر الكيميائية الخمسة.

الجدول 4: 1- الإحداثيات 2- قيم  $\text{Cos}^2$  3- الاشتراكيات على المحاور الثلاثة.

LINGES			AXES PRINCIPAUX										
العناصر			المحور الأول				المحور الثاني				المحور الثالث		
			AXE 1				AXE 2				AXE 3		
الرصاص	001	**	-0.050	0.0208	0.2	*	0.264	0.5792	13.4	*	0.040	0.0130	0.9
	002	**	-0.215	0.3059	4.1	*	0.267	0.4721	15.0	*	0.025	0.0043	0.4
	003	**	-0.114	0.1022	1.1	*	0.257	0.5172	13.1	*	0.125	0.1223	9.7
	004	**	-0.011	0.0012	0.0	*	0.229	0.5355	10.4	*	-0.160	0.2628	16.0
	005	**	-0.043	0.0208	0.1	*	0.232	0.6196	10.4	*	-0.081	0.0762	4.0
	006	**	-0.063	0.0459	0.3	*	0.126	0.1861	2.9	*	-0.015	0.0025	0.1
النحاس	007	**	0.274	0.5246	4.7	*	-0.073	0.0376	0.8	*	-0.177	0.2188	14.7
	008	**	0.298	0.6245	5.5	*	-0.109	0.0835	1.8	*	-0.125	0.1107	7.4
	009	**	0.235	0.5628	3.7	*	-0.114	0.1317	2.0	*	-0.103	0.1081	5.3
	010	**	0.249	0.5371	3.8	*	-0.091	0.0727	1.2	*	-0.048	0.0185	1.0
	011	**	0.318	0.6327	6.5	*	-0.085	0.0454	1.1	*	0.15	0.0014	0.1
	012	**	0.305	0.6791	5.4	*	-0.048	0.0170	0.3	*	-0.009	0.0005	0.0
الكاديوم	013	**	0.221	0.1799	0.2	*	0.253	0.2357	0.5	*	0.019	0.0013	0.0
	014	**	-0.048	0.0078	0.0	*	0.326	0.3590	0.8	*	-0.020	0.0014	0.0
	015	**	0.123	0.0491	0.0	*	0.367	0.4400	1.0	*	0.020	0.0014	0.0
	016	**	0.093	0.0301	0.0	*	0.296	0.3070	0.7	*	-0.230	0.1852	1.3

استخدام " طريقة التحليل العاملي التبادلي A.F.C في دراسة انتشار بعض  
العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة"  
مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية


طوب

	017	**	0.199	0.1526	0.1	*	0.208	0.1656	0.3	*	-0.168	0.1081	0.6
	018	**	0.045	0.0180	0.0	*	0.135	0.1644	0.1	*	-0.027	0.0064	0.0
المنغنيز	019	**	-0.263	0.5798	6.0	*	-0.106	0.0946	2.3	*	-0.116	0.1125	8.7
	020	**	-0.267	0.6683	6.1	*	-0.096	0.0867	1.9	*	0.019	0.0034	0.2
	021	**	-0.306	0.7004	8.0	*	-0.154	0.1768	4.8	*	0.062	0.0290	2.5
	022	**	-0.316	0.7291	9.3	*	-0.157	0.1790	5.4	*	-0.039	0.0112	1.1
	023	**	-0.361	0.7721	11.2	*	-0.149	0.1309	4.5	*	0.022	0.0030	0.3
	024	**	-0.269	-0.6866	6.0	*	-0.130	0.1633	3.4	*	0.010	0.0009	0.1
	025	**	0.183	0.5166	2.1	*	-0.056	0.0492	0.5	*	0.023	0.0080	0.2
التوتياء	026	**	0.180	0.5462	2.1	*	-0.037	0.0229	0.2	*	0.063	0.0663	1.9
	027	**	0.187	0.5188	2.4	*	-0.062	0.0577	0.6	*	0.092	0.1252	4.3
	028	**	0.213	0.5533	2.9	*	-0.027	0.0091	0.1	*	0.065	0.0525	2.1
	029	**	0.262	0.6625	4.5	*	-0.026	0.0065	0.1	*	0.124	0.1486	7.5
	030	**	0.249	0.5826	3.9	*	-0.058	0.0290	0.5	*	0.142	0.1878	9.4

إن نقاط الانتشار الأكثر تمثيلاً على المحور الأول هي نقاط انتشار التوتياء- المنغنيز-النحاس- لأن اشتراكياتها تزيد عن 3.33% وبالتالي قيم  $\text{Cos}^2$  كبيرة، في حين أن العناصر الأكثر تمثيلاً على المحور الثاني تلك المتعلقة بعنصر الرصاص لأن قيم  $\text{Cos}^2$  مرتفعة وبالتالي اشتراكياتها تزيد 3.33% وهكذا بالنسبة لباقي العناصر.

#### التمثيل الهندسي للمخططات العاملية للتحليل لـ AFC:

تُعد المخططات الهندسية البيانية للتحليل العاملي من أهم المراحل في التحليل لأنها تمثل المخرجات في التحليل للمتغيرات والملاحظات في آن واحد فهو إسقاط مزدوج. إن قراءة المخرجات وتفسيرها يحتاج إلى خبرة وممارسة لهذا الأسلوب الإحصائي الحديث. هذا وسنكتفي في دراستنا بعرض المخططات البيانية المؤلفة فقط من المحورين الأول والثاني لـ AFC على النحو التالي:



الشكل (2) المخطط البياني العاملي 2x1 لـ 27 قرية (نقطة معاينة) 5x5 عناصر 5x عينات من كل عنصر.

من المخطط البياني نلاحظ ما يلي:

**-العامل الأول (المحور الأول):** يعيد هذا العامل من أهم العوامل من حيث عدد المتغيرات المرتبطة به، ومن حيث قيمة التباين الذي تم تفسيره بواسطته، فكانت نسبة التباين المفسر 48.2% أي حوالي نصف المعلومات تقريباً التي تضمنتها المعلومات الأصلية، ويشير هذا العامل إلى أهمية مصادر التلوث، حيث يتقابل عليه مصدرا التلوث الذي يتجلى بدور كل واحد منها في تلوث المنطقة المحيطة به، فالقرى الزهراء-مزرعة الحرية-محورته -عرب الملك نقاط محيطة بمصفاة النفط تتقابل مع الأوز-الباصية المنزلة بارمايا نقاط محيطة بالمحطة الحرارية.

**العامل الثاني:** تكثفت حوله النقاط المميزة بارتفاع تراكيز الكاديوم والرصاص كما في الزللو- أوبين ويستخلص هذا العامل حوالي 20.2% من التباين المفسر. وبشكل عام يتقابل مجموعتان على هذا العامل من القرى هما: المنزلة - الزللو - بلغونس - أوبين مناطق غنية بعنصر الكاديوم والرصاص مع المجموعة الثانية التي تشمل على القرى التالية: حريصون محورته قرفيص مناطق غنية بعناصر التوتياء النحاس المنغيز، ودراسة مزدوجة للمحورين معاً نلاحظ أن المناطق القريبة من المحطة الحرارية لاسيما تلك الواقعة في مواجهة الرياح الجنوبية أو الجنوبية الغربية تتصف بارتفاع تركيز عنصر الكاديوم مثال قرية الزللو التي تساهم بـ 29.8% من التباين المفسر حيث يبلغ تركيز عنصر الكاديوم في المتوسط  $1.51 \pm 0.34$  ppm والرصاص

$28.67 \pm 6.76$  ppm تراب، وكذلك الأمر في القرى التالية: بلغونس - المنزلة - شافي روح الباصية - بارمايا، أما المناطق المحيطة بمصفاة النفط: فنلاحظ ارتفاع تراكيز عناصر المنغيز في قرية الزهراء حيث يبلغ تركيز هذا العنصر في المتوسط  $29.78 \pm 0.2$  ppm في حين يبلغ تركيز هذا العنصر في قرية الزللو البعيدة جنوباً  $2.26 \pm 4.46$  ppm وفي قرية أوبين أيضاً  $9.76 \pm 0.91$  ppm بين المجموعتين تتوسط مجموعة ثالثة تتكون من القرى الواقعة جغرافياً بين مصدري التلوث وهي: أبتلة - دير البشل - الأوز - بعمرائل - مزيرع، مجموعة من القرى تركيز العناصر فيها يتعلق بحركة الرياح إذ تتوضع طبوغرافيا على سفوح المنحدرات المحمية إلى حد معين لاسيما الرياح الشمالية مما يخفف تأثير أثر مصفاة النفط عليها. ولتوضيح الدور المشترك لمصادر التلوث في تلويث المناطق بالكاديوم والرصاص الشكل (3) يبين المخطط 3x1 لتحليل العاملي AFC، حيث يلاحظ أن المحطة


استخدام " طريقة التحليل العائلي التبادلي A.F.C في دراسة انتشار بعض

العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة"

مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية

طيوب

الحرارية مصدر تلوث القرى أوبين بلغونس - الزللو - المنزلة في حين تعتبر المصفاة مصدر تلوث القرى محورية - قرفيص - حريصون - من جهة أخرى تبقى المصفاة المصدر الرئيسي لتلوث القرى الزهراء - مزرعة الحرية - عرب الملك - بعنصر المنغيز . أم المحطة الحرارية تعتبر مصدر التلوث الرئيسي للقرى الواقعة جنوب مدينة بانياس والقرى المحيطة بها.



الشكل (3): المخطط 3×1 للتحليل 135×5، لمختلف نقاط المعاينة في المنطقة المدروسة.

وبدراسة مختصرة لهذا المخطط نلاحظ ما يلي:

- العامل الأول: يستخلص 57.5% من التباين المفسر وبالتالي يفصل بشكل واضح بين مصادر التلوث المحطة الحرارية ومصفاة النفط . أما العناصر الأكثر مساهمة في تشكيل هذا العامل هي: النحاس حيث يساهم بـ 35% والتوتياء 18.01% والمنغيز 41.5% من التباين المفسر.
- العامل الثاني: ويحدد 34.5% من التباين المفسر ويتقابل عليه المناطق الغنية بالرصاص والتي تساهم بـ 61.7% من التباين المفسر انظر الجدول 5:

الجدول (5): 1 - الإحداثيات 2- قيم cos2 3- الاشتراكيات

	COLONNES	AXES PRINCIPAUX											
		المحور الأول			المحور الثاني			المحور الثالث					
		AXE 1			AXE 2			AXE 3					
		1	2	%3		1	2	%3		1	2	%3	
Zn	**	-0.226	0.740	18.01	*	0.021	0.006	0.2	*	0.132	0.254	60.0	*
Bp	**	-0.111	0.129	5.5	*	-0.289	0.864	61.7	*	-0.022	0.005	2.0	*

Cu	**	-0.320	0.824	35.0	*	0.102	0.084	6.0	*	-0.107	0.092	38.0	*
Cd	**	0.004	0.000	0.0	*	-0.301	0.298	2.6	*	-0.013	0.001	0.0	*
Mn	**	0.298	0.701	41.5	*	0.195	0.299	29.6	*	-0.001	0.000	0.0	*

### النتائج والمناقشة :

استناداً لمخطط المعاينة المعتمد في هذه الدراسة، المتضمن تحديد عدة نقاط للمعاينة سميت محطة تجريبية، عددها 27 نقطة (قرية)، في كل محطة حددت وبشكل عشوائي خمس نقاط لجمع العينات الترابية موضوع هذه الدراسة الحالية (انظر مخطط المعاينة الشكل رقم (1))، بعد الانتهاء من معالجة العينات الترابية كيميائياً وفق الطرق المشار إليها مسبقاً. نظمت البيانات في جداول إحصائية للعناصر الكيميائية الخمسة المدروسة وهي: التوتياء Zn، النحاس Cu، الكاديوم Cd، المنغنيز Mn، الرصاص Bp، وفق عدة مقاييس: لكل عنصر، لكل محطة، ثم جداول تراكمية ... الخ.

#### \* دراسة الانتشار المكاني للعناصر الكيميائية المدروسة:

إن دراسة الانتشار المكاني للعناصر وفق نقاط المعاينة يسمح لنا بدراسة درجة تباينها أي إظهار حالة عدم التجانس بين نقاط المحطة الواحدة (التباين الداخلي) لكل عنصر إضافة لذلك يسمح لنا بإجراء مقارنة أولية من حيث المبدأ بين مختلف نقاط المعاينة بالنسبة للعنصر الواحد، من أجل تحديد ذلك تم حساب بعض المؤشرات الإحصائية مثل: الوسط الحسابي - الانحراف المعياري، معامل الاختلاف المصحح وفق الصيغة التالية:

$$C.V. \% = 1 + 1/4 * N (C.V) \text{ (انظر SHERRER1984; CUTERON2006)}$$

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة معامل الاختلاف يعبر عنها كنسبة مئوية، وكلما اقتربت قيمة معامل الاختلاف من الصفر كلما دل ذلك على التجانس بين مختلف نقاط المعاينة أو العناصر من حيث تركيزها وقد رتبنا النتائج في جداول لكل عنصر من العناصر انظر الملحق 1، 2، 3، 4، 5 من قراءة أولية لهذه الجداول نستخلص الملاحظات التالية:

1- بالنسبة لعنصر المنغنيز Mn الملحق 1: ارتفاع تركيز هذا العنصر في المناطق المحيطة بمصفاة النفط مقارنة مع القرى المحيطة بالمحطة الحرارية، فأعلى تركيز له لوحظ في قرية الزهراء حيث بلغ 39.01%، ثم يأخذ تركيزه بالتناقص تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً، حيث يبلغ تركيزه مثلاً من قرية المرقب 0.461%، ومن جهة أخرى، نلاحظ أن قيمة معامل الاختلاف النسبية متقاربة من بعضها البعض في المناطق المحيطة بالمصفاة مما يدل على تقارب تركيز هذا العنصر بعنصر المنغنيز .

2- بالنسبة لعنصر التوتياء Zn: الملحق 2: إن تركيز هذا العنصر يبدو متقارباً بين مختلف نقاط المعاينة المحيطة بالمصفاة والمحطة الحرارية، كما أن قيمة معامل الاختلاف تبدو قليلة في بعض القرى الواقعة جنوباً مثل: قرية بارمايا حيث يبلغ 0.4 %، وقرية الزللو حيث يبلغ معامل الاختلاف 6.21 % في حين قيمته تبلغ حوالي 41.30% في قرية عرب الملك نقطة قريبة من مصفاة النفط.

3- بالنسبة لعنصر الرصاص Bp: الملحق 3: يتصف هذا العنصر بأن تركيزه شديد التباين بين نقطة وأخرى فأعلى تركيز له لوحظ في قرية دير البشل حيث بلغ أدنى تركيز له 10.1% وأكبر تركيز 30.2% وبالتالي نلاحظ أن قيمة معامل الاختلاف 55.52% وهذا دليل على شدة التشتت ويُعد في تركيزه ضمن المحطة الواحدة

وكذلك الأمر في قرية قرفيص، الزهراء، ابتلة، الأوز. ويعتبر هذا العنصر من العناصر الهامة في قرية أو بين، حيث يلاحظ أن قيمة معامل الاختلاف منخفضة جداً  $V = 4.001\%$  مما يدل على تقارب في تركيزه في مختلف نقاط المعاينة في هذه المحطة فقد بلغ أدنى تركيز له  $16.7\%$ .

4- بالنسبة لعنصر الكاديوم Cd الملحق 4: نلاحظ انخفاض تركيز هذا العنصر في نقاط المعاينة المحيطة بمصفاة النفط مقارنة بتلك المحيطة بالمحطة الحرارية، كما إن قيم معامل الاختلاف أيضاً منخفضة ومتقاربة، حيث يبلغ تركيزه في قرية ابتلة  $1.98\%$  وقرية مزيرع (تربة مزرعو زيتون) وقرية الزهراء  $1.6$  وأدنى تركيز له لوحظ في قرية بابلوة  $0.25\%$ ، وبشكل عام يرتفع تركيز هذا العنصر على المحور الممتد من المحطة الحرارية باتجاه جنوب شرق مما يفسر ارتفاع تركيزه في هذه القرى. يتميز أيضاً بتباين تركيزه بين نقطة وأخرى، أكبر قيمة لمعامل الاختلاف وجد في قرية الأوز حيث بلغت  $79.33\%$  وكذلك قرية الزهراء  $65.67\%$ . المناطق الغنية بالكاديوم هي: قرية الزللو، الزهراء، ابتلة، الأوز، وأقل تركيز له لوحظ بصورة عامة في المناطق القريبة من مصفاة النفط حيث يتراوح تركيزه بين  $0.33\%$  و  $0.85\%$ .

5- بالنسبة لعنصر النحاس Cu الملحق 5: إن تراكيز هذا العنصر متباينة جداً، ومرتفعة بصورة رئيسية في القرى القريبة من المحطة الحرارية مثل دير البشل، فأدنى تركيز له في قرية الزهراء الواقعة شرق قرفيص وأعلى تركيز وجد في دير البشل  $25.6\%$  ومعامل الاختلاف يتصف بانخفاض قيمته وهذا دليل على تقارب تركيزه في مختلف النقاط انظر الملحق 5.

## الاستنتاجات والتوصيات :

### الاستنتاجات :

بعد تعرضنا لهذه العناصر بشكل إفرادي من المفيد دراسة طبيعية توزعها في المنطقة الممتدة من جنوب مدينة بانياس حتى شمال شرق مصفاة النفط. ومن شط البحر الأبيض المتوسط حتى حدود قرية العنازة أي بعنق حوالي 8-10 كم. والهدف من استخدام هذا أسلوب التحليل العاملية التقابلي يكمن في إمكانية وضع إستراتيجية معاينة وتحليل إحصائي لوضع ما يسمى خارطة توزع مكاني للمنطقة المدروسة تبعاً لتركيز العناصر الكيميائية المعدنية السامة، إن المخططات البيانية للتحليل العاملية من الأشكال 2 و 3 للمحورين الأول والثاني والأول والثالث الـ AFC نستخلص النتائج التالية:

1- عدم تجانس في تركيز العناصر المدروسة بين النقاط الداخلية للمحطة التجريبية الواحدة، وهذا يعود برأينا لعدة عوامل منها: الوضع الطبوغرافي، وموقع النقطة بالنسبة لمصدر التلوث، كذلك وضعها من حيث كثافة الغطاء النباتي، طبيعية التربة المدروسة، تربة مخدومة أو تربة غير مخدومة. بشكل عام يمكننا القول إن تركيز العناصر مرتفعة في الأماكن المكشوفة والأترية غير المخدومة، إضافة لذلك في الأراضي التي يتوضع انحدارها باتجاه مقابل لحركة الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية أي بصورة مقابلة لمصادر التلوث أو المناطق التي يتماثل ارتفاعها مع مداخن أفران المحطة الحرارية أو مصفاة النفط أي بارتفاع يتراوح بين 125-135م.

2- إن نتائج التحليل العائلي AFC انظر المخططات الهندسية 2 و 3 على الترتيب . يلاحظ وجود نوعاً من التجمع للمناطق الغنية ببعض العناصر تبعاً لتركيزها، فالمخطط الهندسي 7 الذي يمثل (5 عناصر × 27 قرية) نستنتج ما يلي:

• ارتفاع تركيز عنصر الرصاص في قرية أوبين بشكل واضح، حيث بلغ تركيزه في المتوسط  $18.23 \pm 0.70$  ومعامل اختلافه 4.001 % مما يدل على أن عنصر الرصاص يُعد من العناصر السامة والهامية في هذه القرية، أم مصدر التلوث الأكثر أهمية هي المحطة الحرارية، مع التأكيد على إمكانية مشاهدة ذرات هباب الاحتراق بالعين المجردة على النبات والأتربة وأوراق الأشجار .

3- ارتفاع تركيز عنصر الكاديوم بشكل ملحوظ في قرية الزللو حيث يتراوح تركيزه في المتوسط  $0.34 \pm 1.51$  ، ثم قرية المنزلة - بارمايا - بلغونس، مجموعة من القرى الواقعة طبوغرافياً في مجرى الرياح الجنوبية الغربية الحاملة معها هباب الاحتراق من المحطة الحرارية والتي يمكن جعلها المصدر الأساسي لتلوث هذه المنطقة.

4- ارتفاع تركيز عنصر المنغنيز في القرى المحيطة بمصفاة النفط، لاسيما قرية الزهراء حيث بلغ تركيزه في المتوسط  $29.70 \pm 6.2$  ppm، في عرب الملك  $31.2 \pm 4.04$  ppm، قرفيص  $27.8 \pm 4.26$  ppm في حين بلغ تركيزه في قرية أوبين  $9.76 \pm 0.91$  ppm، في بارمايا  $7.36 \pm 0.24$  ppm، المنزلة  $9.33 \pm 3.51$  ppm وأخيراً في قرية الزللو  $12.26 \pm 4.46$  ppm إن هذا التباين في التركيز يؤكد دور المصفاة في تلويث المنطقة بعنصر المنغنيز .

5- بالنسبة للقرى التالية: بعمرانيل - دير البشل - المرقب - أبتلة - بستان الحمام. مجموعة من النقاط التي يمكن أن تشكل المحور الأكثر تلوثاً، لموقعها أولاً بين مصدري التلوث، وتحت تأثير الرياح القادمة من الجنوب الغربي المحملة بالهباب الأسود الناتج عن احتراق الفيول في أفران المحطة الحرارية بشكل رئيسي. فعلى سبيل المثال، قرية دير البشل بلغ تركيز التوتياء في المتوسط  $18.25 \pm 0.81$  ppm بلغونس  $15.6 \pm 1.82$  ppm في حين بلغ تركيزه في قرية الزهراء  $5.98 \pm 1.71$  ppm في حريصون  $9.5 \pm 1.17$  ppm بارمايا  $9.6 \pm 0.036$  ppm أما عنصر النحاس فقد بلغ تركيزه في دير البشل  $21.2 \pm 5.97$  ppm، في بلغونس  $14.54 \pm 1.19$  ppm مقارنة مع تركيزه في قرية أو بين والبالغ  $7.55 \pm 1.055$  ppm وفي قرية الزهراء  $4.32 \pm 0.415$  ppm .

6- لإبراز مدى عدم التجانس في تركيز العناصر ودلالاته الإحصائية اجري اختبار ستودنيت للمقارنة بين متوسطات تركيز العناصر المدروسة وحصلنا على النتائج الآتية وفق الجدول الآتي:

العناصر	Zn	Bp	Cu	Cd	Mn
Zn	-				
Bp	5.30	-			
Cu	0.794	5.67	-		
Cd	***37.65	***28.7	***30.08	-	
Mn	5.66	1.01	5.34	***24.55	-

\*\*\*P0.01 فرق معنوي جداً

من الجدول نلاحظ وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات تركيز هذه العناصر لاسيما بين التوتياء والرصاص والنحاس والكاديوم ، وهذه تؤكد صحة الفرضية القائلة بوجود فروق دالة إحصائية في تركيز وانتشار العناصر المدروسة وهذا يعود إلى طبيعة المنطقة الجغرافية والطبوغرافية وطبيعة التربة مخدومة أم غير مخدومة أيضاً تربة مغطاة الأشجار حراجية أم تربة مغطاة الأشجار المثمرة . كما أجريت دراسة لمقارنة لتشتت التباين في تركيز العناصر وذلك باستخدام اختبار F نسبة التباين =


$$\frac{\text{بايون الاك ب}}{\text{بايون الاصغر}}$$

وذلك عند مستوى دلالة 1 % تبين وجود فروق دالة إحصائية بين تباين العناصر بين نقاط المعانية ضمن المحطة الواحدة وكذلك بين المحطات فكانت قيمة F نقاط المحطة تتراوح بين 285.6 و 102.1 بالنسبة لعنصر النحاس بينما الفروق غير دالة بين نقاط المعانية بالنسبة لعنصر المنغنيز وهذا يؤكد صحة الفرضية القائلة بوجود فروق دالة بين المحطات بالنسبة لتركيز العناصر وهذا يعود بالدرجة الأولى لموقع نقطة المعانية بالنسبة لمصدر التلوث واتجاه الرياح الحاملة لهباب الفحم المنبعث من مصادر التلوث.

7- من خلال ما تقدم من نتائج نستطيع أن نحدد بشكل أولي وجود ثلاثة محاور للتلوث بالنسبة لمصادر

التلوث هي: انظر الشكل (4) هي:

- المحور الأول: يمتد هذا المحور من المصفاء قرب الشاطئ باتجاه شمال شرق، يشتمل على القرى الآتية : عرب الملك - حريصون - قرفيص - محورية الزهراء، تتصف تربة هذه القرى بغناها بعنصر المنغنيز، وتُعد مصفاة النفط هي المصدر الأساسي لتلوثها.
- المحور الثاني: يمثل مجموعة القرى المنتشرة من المحطة الحرارية في الباصية جنوب بانياس باتجاه جنوب - شمال شرق وهي: قرية الأوز- بعمرائيل المنزلة - أويين - الزللو- دير البشل - بلغونس، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرى تتعرض أيضاً للتلوث من المصفاء لاسيما قرية دير البشل - بلغونس - الزللو، تتميز هذه القرى بارتفاع تركيز عنصر الرصاص والكاديوم مقارنة بالعناصر الأخرى.
- المحور الثالث: يمثل القرى القريبة من المحطة الحرارية باتجاه الدعتورية - المرقب . تتصف هذه القرى بأن العناصر الأكثر أهمية فيها هي التوتياء - النحاس مقارنة مع القرى الأخرى.



الشكل (4) يبين مجموعات القرى بحسب تركيز العناصر فيها وفق نتائج التحليل العائلي التفاضلي AFC

### التوصيات :

- يجب ألا يكون التهديد بمخاطر التلوث عائقاً يحول دون الأخذ بوسائل التنمية وإدخال التكنولوجيا الحديثة، واستيعاب طرائق الإنتاج المتطورة في مرحلة مبكرة على تلافي مخاطر التلوث بالتخطيط العلمي بحيث لا يؤدي الأخذ بوسائل التنمية الحديثة إلى إحداث الخلل بمتطلبات الصحة العامة، وتقرح من خلال ما توصلنا إليها من معلومات إلى التوصيات التالية:

1- التخطيط العلمي السليم عند إنشاء منشأة صناعية لاسيما تلك التي تستخدم الوقود الأحفوري مثل الفويل، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار المناخ والتضاريس، وعدم السماح ببناء المنشآت الصناعية التعدينية الثقيلة بالقرب من المدن كصناعة النفط وتوليد الطاقة الكهربائية.

2- ضرورة العناية والمراقبة الدائمة لآلات الاحتراق بهدف تخفيف الملوثات التي تنفثها.

3- لتقليل أثر هذه المنشآت، يتطلب إقامتها في أماكن بعيدة ومرتفعة، جيدة التهوية، وتزويدها بمدخن مرتفعة لا تقل عن 125 م، أو تزويدها بأجهزة لاقطة للملوثات إلى غير ذلك.

4- الاهتمام بزراعة الأشجار والغابات وتجديدها وزيادة المسطحات الخضراء، إلى جانب اتخاذ الطرائق الحديثة في التخلص من الملوثات أو الإقلال منها لدرجة يستطيع معها النبات امتصاصها وأفضل النباتات تلك ذات الأوراق الملساء.

5- بما أن الطاقة عنصر أساسي لتحقيق برامج التنمية، لا بد من تحقيق التوازن بين التنمية والطاقة والبيئة.

6- إعداد برامج في العلوم البيئية توجه إلى المهنيين من الفئات المتخصصة، الكيماويين أصحاب المشاريع التي تتطلب استخدام الوقود في تصنيعها.

7- إعداد وتطوير الوسائل المناسبة لتعميق مفهوم التربية البيئية بمختلف الوسائل الإعلامية المعروفة.

8- للوقوف بشكل دقيق على توزع وانتشار العناصر السامة، وبيان أثرها التراكمي، وتأثيراتها على مختلف جوانب الحياة الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية، لا بد من إجراء دراسات لفترات زمنية طويلة، تجمع خلالها العينات على فترات زمنية منتظمة وقصيرة، إجراء دراسة شاملة للمنطقة الساحلية تشمل على دراسة: التربة - النبات - والكائنات الحية لاسيما الإنسان.

9- وضع تشريعات ولوائح ومقاييس خاصة بالتركيز القصوى للملوثات التي يسمح بوجودها في الهواء خاصة في الأماكن القريبة من المنشآت الصناعية.

10- المجموعة الإحصائية السورية. المكتب المركزي للإحصاء. 2004

## المراجع:

1. ANDERSON ( T.F) .- *An Introduction to Multivariable Statistical Analysis* . Wiley and Sons , New York , 1958,374.
2. BENZCRI ( J.P) .- *L'analyse des donnees* . Tome II . *L'Analyse Factorielles des Correspondences* , Dunod , Paris , 1973.Fr VII + 619 .
3. BERTHOUEX.P.M.- *Statistics for Environmental Engineers*. Lewis Publishers.2002.
4. CAZES.P. *Quelques Methodes d analyse Factorielle D une series de tableaux de donnees*.Revue MODULAD. 2004,1-31..
5. COUTERON. P.*Statistiques spatiales appliqués a l etude de la vegetation: un lien entre structure et processus dynamiques*.These de Doctorat Universitaire .Uni. Montpellier . 2006,169.
6. GODARD.V. *Reflex ion sur le plan dechantillonnage appliqué a la quantification des paysages.l espace geographiques ( forme soumise)*.2006.
7. FRONTIER (S) ,.- *Abrégé de méthode statistique* , application à l'écologie , la médecine & biologic , Masson , Paris 1980,242.
8. FRONTIER (S),.- *Stratégies d'échantillonnage en écologie* , collection d'écologie 17 , Masson , Paris Fr, 1982,493.
9. FAREY (J,B) & NELSON (A,L),.-*Atomic Absor. spectro*. Elsevier Scientific publishing comp. Amst ,Netherland 1982. (67-94).
10. LEGENDER (L) , LEGENDER (P) , - *Ecologie numérique* , Tome I , *le traitement multiple des données écologiques* ; Tome II , *la structure des données écologiques* , Masson , Paris, 1984,XIV + 197p & VIII + 25.
11. LEGENDRE.P. BORCARD.D. *Quelles sont les Echelles spatiales importantes dans un ecosysteme?*In: J.J .DROESBEKE. LEJEUNE & SAPORTA.G. ( eds) *Analyse statistique de donnees spatiales*.Paris.Editions.TECHNIP.2002.
12. LINCY.J.*Methodes en analyse multivariee: voisinage et diversite*. These.Fin edudes.Uni.Montpllier II.2003
13. RENCHER.AC. *Methodes of Multivariate Anlysis*.John Wiley & sons.2002 864p
14. SOKAL ( K), ROHLF (F) ,.- *Biometry* . W.H.Freeman & Comp. New York , 1981,838.
15. SCHERRER (B), *Biostatistique* , éd, gaetan marin, Québec CANADA, 1984,840.
16. جون راين، جورج اسطفان و عبد الرشيد. تحليل التربة والنبات دليل مخبري. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ICARDA . حلب سورية و المركز الوطني للبحوث الزراعية باكستان NARC 163ص.
17. د. عبد العزيز أسعد. 1988. - الكيمياء التحليلية. تحليل كمي. منشورات جامعة تشرين.
18. د. علي حسن موسى. 1988. - التلوث الجوي. دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 263ص.
19. د. عبد الله أبو عياش. 1984. الإحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات، مع تطبيقات جغرافية. نشر وكالة المطبوعات ، الكويت، 368ص.

20. د. غازي أبو شقر. 1994. - البيئة والتراث. نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر. عمان الأردن. الطبعة الأولى.
21. د. غازي أبو شقر. 1994. - الطاقة والبيئة. نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر. عمان الأردن. الطبعة الأولى.
22. د. فلاح أبو نقطة. 1981. أساسيات الأراضي. الجزء العملي. منشورات جامعة دمشق.
23. د. سعد انطلي. 1990. الأمن الصناعي. التلوث.
24. د. محمد سعيد ورشيد الحمد. 1979. البيئة ومشكلاتها. الطبعة الثانية. سلسلة عالم المعرفة. العدد 22.
25. د. محمود السيد أبو النيل. 1986. التحليل العائلي. سلسلة علم النفس /6/. دار النهضة العربية. القاهرة. 470ص.
26. د. محمد العودات. 1988. التلوث وحماية البيئة. الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. سورية.

الملحق 1: التراكيز الدنيا - العظمى - المتوسطة جزء بالمليون، ppm واحدات من الانحراف المعياري، معامل الاختلاف % لعنصر Mn،  
في مختلف نقاط المعاينة.

i	اسم المحطة	القيمة الدنيا	القيمة العظمة	$\bar{x} \pm \sigma$	معامل الاختلاف %
1	أرض المصفاة	20.38	29.9	26.46 $\pm$ 3.1	12.12
2	عرب الملك	28	38.36	31.206 $\pm$ 4.04	13.5
3	مزرعة الحرية	20.95	28.67	27.3 $\pm$ 2.84	10.84
4	حريصون	18.4	20.46	19.89 $\pm$ 0.72	3.78
5	غابة قرفيص	20.46	31.1	27.8 $\pm$ 4.26	15.47
6	قمة هضبة غابة قرفيص	21.53	31.43	26.25 $\pm$ 3.4	13.5
7	محورته	25.88	30.99	27.4 $\pm$ 1.65	6.28
8	الزهراء	24.35	39.01	29.78 $\pm$ 6.2	21.7
9	تربة زيتون قرفيص	22.98	24.35	23.63 $\pm$ 0.66	2.91
10	دير البشل	16	20.30	18.12 $\pm$ 1.66	9.95
11	بلغونس	16.12	21.33	18.06 $\pm$ 1.95	11.25
12	شافي روح	7.3	8.89	8.34 $\pm$ 0.74	9.25
13	بايلوطة	8.9	15.34	9.98 $\pm$ 2.4	25.6
14	بستان الحمام	8.91	13.99	11.46 $\pm$ 2.51	22.82
15	أوبين	7.98	10.43	9.76 $\pm$ 0.91	9.72
16	الزللو	7.81	18.82	12.26 $\pm$ 4.46	37.91
17	المنزلة	9.26	9.36	9.33 $\pm$ 3.51	39.2

18	ابنتلة	17.01	19.302	18.15 ± 1.13	6.5
19	الأوز	6.99	9.99	8.23 ± 1.1	13.93
20	بعمرائيل	7.81	9.98	8.72 ± 0.88	10.52
21	بارمايا	7.24	7.9	7.36 ± 0.24	3.41
22	مزيريع	16.56	17.7	16.86 ± 0.27	1.671
23	تربة زيتون مزيريع	16.56	16.9	16.66 ± 0.115	0.72
24	المرقب	0.46	18.95	14.37 ± 4.07	29.51
25	طريق الدعورية	10.24	19.35	15.99 ± 3.8	24.76
26	الدعورية	10.25	16.3	13.73 ± 2.62	19.89
27	الباصية- المحطة الحرارية	6.92	17.25	10.29 ± 3.94	37.6

الملحق 2: التراكيز الدنيا - العظمى - المتوسطة جزء بالمليون، ppm واحداث من الانحراف المعياري، معامل الاختلاف % لعنصر Zn، في مختلف نقاط المعاينة.

i	اسم المحطة	القيمة الدنيا	القيمة العظمة	$\bar{x} \pm \sigma$	معامل الاختلاف %
1	أرض المصفاة	9.94	17.9	12.95 ± 3.14	25.27
2	عرب الملك	8.25	17.59	13 ± 3.76	41.30
3	مزرعة الحرية	8.26	10.08	9.16 ± 0.68	74.7
4	حريصون	7.88	11.1	9.5 ± 1.17	38.12
5	غابة قرفيص	16.22	20.17	18.06 ± 1.85	10.68
6	قمة هضبة غابة قرفيص	10.54	17.11	15.3 ± 2.2	14.99
7	محورته	10.56	19.45	15.17 ± 3.4	23.36
8	الزهراء	3.96	8.4	5.95 ± 1.71	29.8
9	تربة زيتون قرفيص	3.80	5.8	4.21 ± 0.72	17.82
10	دير البشل	16.99	19.5	18.25 ± 0.81	4.63
11	بلغونس	12.9	17.19	15.6 ± 1.92	12.83
12	شافى روح	10.35	17.4	14.26 ± 2.56	18.86
13	بايلوطة	10.92	16.07	14.07 ± 2.09	15.5
14	بستان الحمام	15.9	15.94	15.93 ± 0.006	0.432
15	أويين	8.34	10.59	9.40 ± 0.66	7.27
16	الزللو	8.49	10.54	9.4 ± 0.56	6.21
17	المنزلة	12.02	14.53	13.12 ± 0.88	6.99
18	ابنتلة	15.92	14.96	15.94 ± 0.0061	0.04
19	الأوز	12.31	15.65	13.83 ± 1.56	11.72

استخدام " طريقة التحليل العنصري A.F.C في دراسة انتشار بعض العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة"

مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية

طوب

20	بعمرائيل	11.63	15.41	13.44	$\bar{x}$	1.65	12.8
21	بارمايا	9.52	9.7	9.6	$\bar{x}$	0.036	0.4
22	مزيريع	10.06	22.9	17.5	$\bar{x}$	5.32	32.32
23	تربة زيتون مزيريع	13.47	14.002	13.56	$\bar{x}$	0.20	1.54
24	المرقب	10.35	17.4	14.27	$\bar{x}$	2.56	18.7
25	طريق الدعورية	10.8	12.44	12.16	$\bar{x}$	0.75	6.43
26	الدعورية	13.57	16.7	15.46	$\bar{x}$	1.40	9.44
27	الباصية- المحطة الحرارية	10.63	14.8	3.46	$\bar{x}$	1.32	10.22

الملحق 3: التراكيز الدنيا - العظمى - المتوسطة جزء بالمليون، ppm واحداث من الانحراف المعياري، معامل الاختلاف % لعنصر Zn، في مختلف نقاط المعاينة .

i	اسم المحطة	القيمة الدنيا	القيمة العظمى	$\bar{x}$	$\sigma$	معامل الاختلاف %
1	أرض المصفاة	8.4	21.6	15.15	4.30	29.58
2	عرب الملك	13.42	22.4	17.02	3.82	23.4
3	مزرعة الحرية	15	22.2	18.3	2.26	12.87
4	حريصون	15.3	21.6	18.12	2.85	16.4
5	غابة قرفيص	17.4	39.6	23.07	8.37	37.81
6	قمة هضبة غابة قرفيص	17.4	38.2	23.59	7.54	33.305
7	محورته	16.8	24	19.92	2.99	15.65
8	الزهراء	18.1	35.8	22.94	6.25	28.4
9	تربة زيتون قرفيص	9	19	14	5	37.21
10	دير البشل	10.1	30.2	17.23	9.18	55.52
11	بلغونس	20.4	27.1	24.87	3.16	13.24
12	شافي روح	8.5	15.4	11.7	3.21	28.6
13	بايلوطة	7.7	21	13.97	4.20	31.33
14	بستان الحمام	8.7	11.1	10.025	0.80	8.32
15	أوبين	16.7	18.6	18.23	0.70	4.001
16	الزللو	13.9	32.7	28.87	6.76	24.4
17	المنزلة	18	22.3	14.22	1.43	7.26
18	ابتلة	9.7	9.8	9.79	3.73	39.7
19	الأوز	11.1	18.9	12.4	2.92	24.54
20	بعمرائيل	8.9	10.2	9.7	0.43	4.62

21	بارمايا	15.2	21.6	16.35	$\bar{x}$	2.35	14.98
22	مزيريع	9.7	15.3	13.77	$\bar{x}$	2.15	16.27
23	تربة زيتون مزيريع	12	13	12.2	$\bar{x}$	0.37	3.106
24	المرقب	10.4	17.7	13	$\bar{x}$	2.32	18.6
25	طريق الدعتورية	8	14	10.82	$\bar{x}$	2.41	23.21
26	الدعتورية	8	10.2	9.4	$\bar{x}$	0.81	8.98
27	الباصية- المحطة الحرارية	17.5	26.4	19.4	$\bar{x}$	3.20	17.2

الملحق 4: التراكيز الدنيا - العظمى - المتوسطة جزء بالمليون، ppm واحداث من الانحراف المعياري، معامل الاختلاف % لعنصر Cd، في مختلف نقاط المعاينة.

i	اسم المحطة	القيمة الدنيا	القيمة العظمى	$\bar{x}$	$\sigma$	معامل الاختلاف %	
1	أرض المصفاة	0.40	0.90	0.58	$\bar{x}$	0.16	26.6
2	عرب الملك	0.48	0.70	0.585	$\bar{x}$	0.09	15.86
3	مزرعة الحرية	0.37	0.71	0.492	$\bar{x}$	0.109	23.09
4	حريصون	0.41	0.85	0.55	$\bar{x}$	0.14	26.53
5	غابة قرفيص	0.40	0.70	0.533	$\bar{x}$	0.094	18.38
6	قمة هضبة غابة قرفيص	0.33	0.70	0.48	$\bar{x}$	0.115	24.97
7	محورته	0.40	0.48	0.42	$\bar{x}$	0.029	7.2
8	الزهراء	0.30	1.6	0.73	$\bar{x}$	0.46	65.67
9	تربة زيتون قرفيص	0.30	0.41	0.36	$\bar{x}$	0.049	14.2
10	دير البشل	0.40	0.70	0.65	$\bar{x}$	0.11	17.64
11	بلغونس	0.40	0.62	0.515	$\bar{x}$	0.065	13.16
12	شافي روح	0.36	0.90	0.53	$\bar{x}$	0.185	36.38
13	بابلوطة	0.25	0.80	0.42	$\bar{x}$	0.19	47.14
14	بستان الحمام	0.54	0.61	0.59	$\bar{x}$	0.028	4.95
15	أوبين	0.51	0.73	0.68	$\bar{x}$	0.08	12.26
16	الزللو	0.80	1.90	1.51	$\bar{x}$	0.34	23.47
17	المنزلة	0.60	0.75	0.68	$\bar{x}$	0.049	7.51
18	ابنتة	0.70	1.98	1.12	$\bar{x}$	0.6	55.83
19	الأوز	0.30	1.30	0.486	$\bar{x}$	0.37	79.33
20	بعمرائيل	0.40	0.46	0.42	$\bar{x}$	0.022	5.49
21	بارمايا	0.70	0.80	0.74	$\bar{x}$	0.038	5.35
22	مزيريع	0.36	0.70	0.44	$\bar{x}$	0.13	30.8
23	تربة زيتون مزيريع	0.44	1.80	1.30	$\bar{x}$	0.61	48.9
24	المرقب	0.44	0.70	0.54	$\bar{x}$	0.1007	19.43
25	طريق الدعتورية	0.44	0.53	0.49	$\bar{x}$	0.04	8.51
26	الدعتورية	0.45	0.58	0.54	$\bar{x}$	0.014	2.7

استخدام " طريقة التحليل العائلي التقابلي A.F.C في دراسة انتشار بعض  
العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة"  
مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية

طيوب

27	الباصية- المحطة الحرارية	0.40	0.71	0.53	$\bar{x}$	0.13	25.56
----	--------------------------	------	------	------	-----------	------	-------

الملحق 5: التراكيز الدنيا - العظمى - المتوسطة جزء بالمليون، ppm واحدات من الانحراف المعياري، معامل الاختلاف % لعنصر Cu، في مختلف نقاط المعاينة

i	اسم المحطة	القيمة الدنيا	القيمة العظمة	$\bar{x} \pm \sigma$	معامل الاختلاف %
1	أرض المصفاة	8.8	18.98	14.68 $\pm$ 3.89	27.64
2	عرب الملك	8.41	18.89	13.30 $\pm$ 3.98 7	31.18
3	مزرعة الحرية	8.4	12.22	10.56 $\pm$ 1.44	14.22
4	حريصون	8.31	11.8	10.66 $\pm$ 1.494	14.61
5	غابة قرفيص	10.6	12.4	11.69 $\pm$ 0.805	7.18
6	قمة هضبة غابة قرفيص	6.7	13	10.64 $\pm$ 2.66	26.05
7	محورته	10.04	15.1	11.53 $\pm$ 1.70	15.37
8	الزهراء	4	5	4.32 $\pm$ 0.415	10.009
9	تربة زيتون قرفيص	3.8	4.8	4.033 $\pm$ 0.354	9.147
10	دير البشل	12.7	25.6	21.2 $\pm$ 5.97	29.34
11	بلغونس	12.8	15.4	14.54 $\pm$ 1.192	8.544
12	شافي روح	8.3	10.3	9.07 $\pm$ 0.82	9.42
13	بابلوطه	11	22.2	15.15 $\pm$ 4.44	33.98
14	بستان الحمام	17.04	22.4	20.04 $\pm$ 2.14	11.13
15	أوبين	6.3	9	7.55 $\pm$ 1.055	14.57
16	الزللو	11.63	15.4	13.43 $\pm$ 1.635	18.79
17	المنزلة	10.3	13.6	11.13 $\pm$ 1.162	10.88
18	ابتلة	15.6	16.6	15.82 $\pm$ 0.36	2.37
19	الأوز	10.3	15.44	14.45 $\pm$ 1.86	13.413
20	بعمرائيل	10.3	12.05	11.24 $\pm$ 0.81	7.51
21	بارمايا	8.4	13.06	11.08 $\pm$ 2.01	18.9
22	مزيريع	8.3	18.9	14.92 $\pm$ 4.34	30.31
23	تربة زيتون مزيريع	10.3	11	10.55 $\pm$ 0.32	3.16
24	المرقب	13.4	15.4	15 $\pm$ 0.72	5.001
25	طريق الدعورية	9.34	19	13.44 $\pm$ 3.14	24.34

استخدام " طريقة التحليل العائلي التقابلي A.F.C في دراسة انتشار بعض  
العناصر المعدنية السامة الناتجة عن بعض المنشآت الصناعية الثقيلة"  
مصفاة النفط والمحطة الحرارية في مدينة بانياس الساحل سورية

طيوب

2 6	الدعورية	7.45	14.3	12.00 2	$\bar{x}$	2.27	19.71
2 7	الباصية- المحطة الحرارية	8.3	20.6	16.45	$\bar{x}$	4.66	29.52